# 洪氏集驗方

# 全生指迷方

# 叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

# 全生指迷方

撰 昡 王

本館叢書集成初編所選
墨海金壺及珠叢別錄皆
收有此書同一版本墨海
在先故據以排印

# 原序

余昔任左史。遇疾瀕死。考城王貺子亨爲察衆工之用藥。而余以生。因以其所著全生方一編遺予藏之未暇讀也。繼掌外制。一日得異疾。謀諸醫未決。子亨笑曰。毋恐。此吾書所有也。視某章病當某藥。如方信宿而疾良已。於是始奇之。歸居淮南。去王城遠。偶有病秖訊於書。謫三巴。遷百粵。去醫益遠。又鬻本以歸。余余以爲之表其端曰。此書直而遂。曲而通。部居標列。而脈絡潛流。形色昭彰。而對治要妙。知方者讀之智思橫生。不知者猶可按圖而愈疾。眞衞生之奇寶。濟物之良術也。至理不煩。至語不費。余非知道者。而於此乎取之。子亨當官不苟。遇世變嘗慨然再請出疆萬里。其論著此書。用心救世利物。不特此矣。吳敏序

# 自序

德彌大者常存乎好生之心志彌廣者每切於立言爲教在上世則有伊尹逮後漢乃見張機祖述神農之經發明黃帝之道雖然術至通神之妙在乎知慮以爲先藥至起生之功必因精能而後效天無棄物非人莫知所能人有常心非道莫知所適凝神自悟觸理皆分故能贊益天機悉體陰陽之變深窮造化博極生死之源候色驗形自契一時之理剖腸剖臆難傳後代之精至於湯液除疴砭石起死必當研窮性味斟酌淺深治理在於君臣協攻資乎佐使方書之行其來尚矣有人猶不能刻意研求專心致志攖邪抱病則束手無能制療處方則委身紕繆余竊悲之於是採古人之緒餘分病證之門類別其疑似定其指歸陰陽既明虛實可攷若能按圖求治足以解惑指迷雖未起死回生庶幾扶危拯困故號曰全生指迷以崇大倫之道焉考城王貺子亨序

# 全生指迷方提要

全生指迷方四卷宋王貺撰案書錄解題貺字子亨考城人名醫宋毅叔之婿宣和中以醫得幸官至朝請大夫是書宋史藝文志作三卷而傳本久絕故醫家罕所徵引或至不知其名今檢永樂大典所收按條掇拾雖未必盡符原本然大要已略具矣方書所載大都皆標某湯某丸主治某病詳其藥品銖兩而止獨貺此書于每證之前非惟具其病狀且一一論其病源使讀者有所据依易於運用其脈論及辨脈法諸條皆明白曉暢凡三部九候之形病證變化之象及脈與病相應不相應之故無不辨其疑似剖析微茫亦可爲診家之樞要謹詳加訂正分爲二十一門依類編次而以論脈諸篇冠之于首因篇頁稍繁釐爲四卷不復如其原數焉

# 全生指迷方卷一

宋 王

## 脈論

論曰人以天地之氣生四時之法成是以有五藏六府四肢十二經三百六十五穴以象五運六氣四時十二月周天之度陰陽變化與天地同流乖其氣逆其理則陰陽交錯府藏偏毗脈行遲速榮衛虛候百病從生非脈無以探賾索隱所謂脈者乃天眞之元氣有生之精神精神去榦脈理乃絕故上古聖人體性窮形剖別藏府詳辨經絡會通內外各著其情氣穴所發各有腧名善診脈者靜意視義觀其變於冥冥之中以神合神悠然獨悟口弗能言先別陰陽審清濁而知分部視喘急聽音聲而知病所生所謂陰陽者至者爲陽謂隨呼而出也去者爲陰謂隨吸而入也動者爲陽鼓擊躁急也靜者爲陰來去沉沉默默也數者爲陽謂一呼一吸六至也遲者爲陰謂往來不滿三至也於三部九候之內察其脈形有獨異者謂獨大獨小獨疾獨遲獨不應四時者乃受病之所也

### 辨五藏六府部位脈法

左手寸口脈浮取之屬小腸爲府沉取之屬心爲藏其經則手太陽少陰左手關上脈浮取之屬膽爲府沉取之屬肝爲藏其經則足少陽厥陰左手尺中脈浮取之屬膀胱爲府沉取之屬腎爲藏其經則足太

陽少陰。右手寸口脈。浮取之屬大腸爲府。沉取之屬肺爲藏。其經則手太陰陽明。右手關上脈。浮取之屬胃爲府。沉取之屬脾爲藏。其經則足太陰陽明。右手尺中脈。浮取之屬三焦爲府。沉取之屬心胞絡。又屬右腎。其經則手少陽厥陰。

辨人迎三部趺陽九候五藏六府脈法

論曰。診脈之法。其要有三。一曰人迎。在結喉兩傍。取之應指而動。此部法天也。二曰三部。謂寸關尺也。于腕上側有骨稍高曰高骨。先以中指按骨。謂之關。前指爲寸部。後指爲尺部。尺寸以分陰陽。陽降陰升。通度由關以出入。故謂之關。此部法人。三曰趺陽。在足面繫鞋之所。按之應指而動者是也。此部法地。三者皆氣之出入要會。所以能決吉凶死生。凡三處大小遲速。相應齊等。則爲無病之人。故曰人迎趺陽三部不參動數。發息不滿五十。未知生死。以三者爲決死生之要也。故人迎一盛。病在太陽。謂陽極也。四盛以上爲隔陽。謂無陰以收也。寸口一盛。病在少陰。二盛。病在太陰。三盛。病在厥陰。厥有盡也。四盛以上爲關陰。謂無陽以繫也。隔陽者。氣上而不能下。則吐逆。關陰則閉塞。大小便不通。皆死不治。九候者。謂三部之位。一位有三候。浮取之屬陽。沉取之屬陰。中得之爲胃氣。故無胃氣則死。五藏之脈。輕手于皮膚得之者肺也。至肌得之者心也。至肉得之者脾也。至筋得之者肝也。至骨得之者腎也。五者輕重皆應。是謂五藏之氣全也。又有推而外之在經絡。推而內之在血脈。凡診平人之脈。當以平旦陰氣未動。陽氣未散。飲食未進。脈絡調和。可以見有餘不足之脈。一呼行三寸。一吸行三寸。呼吸行六寸。而脈四至。呼吸之間又一

至此盛脈。得天全者也。若過十息。脈應五十動。又須與氣相應。往來緩急得中。潤澤如慢水流行源源者。此壽脈無疾也。若不滿五十動一止。此一藏之氣絕。四歲死。三十動一止。三歲死。二十動以下一止。期以歲月死。若與形氣不相應。往來短促。枯燥。無首尾。此不壽之脈而多病。凡診病脈則不拘晝夜。審脈所以察其由。則寒熱虛實見矣。凡脈病人不病者死。人病脈不病者生。

診諸病證脈法

論曰。脈變於內。病形於外。相參以察其理。氣熱脈滿。是謂重實。脈實以堅。謂之益甚。上下相失。不可數者死。謂至數也。脈口熱而尺反緩。皮膚外證也。滑則從濇則逆。寸口膚熱。而尺膚寒。是經氣有餘。絡氣不足也。尺膚熱。脈滿。寸口膚寒。脈濇。是經氣不足。絡氣有餘也。脈寸虛尺虛。是謂重虛。重虛者死。寸虛者病情無常。神不守也。尺虛者行走惙然。脈滑則生。濇則死。脈急大堅。尺濇而不應。謂之形滿。手足温則生。寒則死。乳子中風熱喘鳴肩息。脈緩則生。急則死。下痢白沫。脈沉則生。浮則死。下痢膿血。脈懸絕則死。滑則生。浮濇之脈。身有熱者死。癲疾之脈。博大而滑。久久自已。脈小堅急。死不治。病人口甘而渴。此數食甘美而多肥。五氣之溢也。謂之脾癉。病人口苦。此因數謀慮不決。膽虛氣上溢。是謂膽癉。凡消癉之脈。實大。病久可治。病人身熱如炭。頸膺如格。人迎躁盛。喘息氣逆。太陰脈微細如髮者死不治。謂氣口與人迎不相應也。心脈滿大。痫瘛筋攣。肝脈小急。痫瘛筋攣。肝脈驚暴有所驚駭。無故而瘖。脈不至。不治自已。謂氣暴厥也。氣復則已。腎脈小急。肝脈小急。皆爲瘕。肝脈併沉爲石水。併浮爲風水。併虛爲死。併小弦爲驚。腎脈大

急沉。肝脈大急沉。皆爲疝。肺沉博爲肺疝。太陽急爲痙。膀胱氣也。太陰急爲脾疝。少陰急爲癇厥心病也。少陽急爲驚。膵病也。脾脈沉鼓爲腸癖。由飽食而筋脈橫解腸癖爲痔。胃脈沉鼓濇。胃外鼓大。心脈小急。皆爲偏枯。年不滿二十者三歲死。脈至而搏。血衄身熱者死。心肝脈小沉濇爲腸癖。心脈至如喘。名曰暴厥。不知。與人言脈至如數。使人暴驚三四日自已。胃脈有餘。病皮痺閉不通。皿生癮疹。不足。病肺痺寒濕。脾脈有餘。病肉痺。寒中陰隔寒也。不足。病脾痺。肝脈有餘。病筋痺。脇滿不利。不足。病肝痺。腎脈有餘。病骨痺。身重。不足。病腎痺。凡陰病見陽脈者生。謂病人四肢厥。惡寒多汗。脈得洪大數實也。陽病見陰脈者死。謂病人身熱狂躁譫言欲飲水。脈得沉細微遲也。

## 辨脈形及變化所主病證法

浮脈之狀。在皮膚。輕手得之。重按則似有若無。王於秋。主脈。主風。主虛乏短氣。秋得之爲順。春得之爲賊邪。冬得之爲虛邪。夏得之爲實邪。又爲微邪。其病不治自愈。純浮爲感風。浮弦爲虛勞。浮緊爲風寒。浮芤爲劒血。浮滑爲風痰。浮洪爲風氣壅滯。浮微爲氣不足。浮緩爲風虛。四肢不隨。浮濇爲傷肺。咯血嗽血。浮遲爲傷憊。浮弱爲虛損。浮濡爲氣血俱不足。又看見於何部位。以藏府經絡推之。餘皆倣此消息。

沉脈之狀。取於肌肉之下得之。主藏病。沉滯伏匿。在寸爲心肺鬱伏。悲憂不樂。在關爲肝脾不利。中滿善噫。膈脹。濕勝則脾滿溏泄。食不化。支膈胠脇滿。善恐。在尺則爲石水。腹腫硬。以指彈之。殼殼然有聲。小便澀。沉緊爲腸間積寒痛。沉澀結爲五氣積聚成形。沉數或疾爲骨蒸。沉滑爲腎消骨枯。善渴小便數。純沉

爲腫重。足膝不利。不得履地。得之於陰濕之氣。沉而微。天藏氣衰。骨痿不能起。

遲脈之狀。往來極遲。一息三至。爲陰盛陽虛之候。若手足厥不回者死。五藏氣短。不能朝於氣口。肺腎俱衰也。太素脈訣。作肺腎俱絕。陳無擇三因方云。遲者應動極緩。與人迎相應。則濕寒凝滯。與氣口相應。則虛冷沉積。爲寒爲痛。遲而濇爲癥瘕咽酸。

數脈之狀。往來急數。一息六至。爲陽盛陰微之候。寸脈見之。爲熱爲躁爲煩。左關爲目赤頭疼煩滿。右關爲口臭胃煩嘔逆。尺中見。爲小便黃赤。大便閉澁。與人迎相應。爲熱。與氣口相應。或爲瘡。洪脈之狀。大而隱指。若大而散漫。是謂氣衰。大而浮。風客於衞。欬出青黃膿如彈丸。大若不出。則傷肺。下利得脈大。利益甚。霍亂得之。則吉。又其脈主夏屬心。

虛脈之狀。浮大無力。遲而且柔。又如蜘蛛絲。此陽氣衰。少陰獨居。爲多汗亡陽。形氣蕭索。其人不壽。

散脈之狀。浮而無力。至數不齊。渙漫不收。更甚于虛。或來多去少。按之如無。此氣血俱虛。根本脫離之候。左寸軟散。爲陽虛不斂。右寸見之。爲氣耗汗出。肝脈軟散色澤者。富病溢飲。脾脈得之。色不澤。當病足腫。尺脈見散。爲精氣衰耗。又產婦得之。生。孕婦得之。死。

芤脈之狀。如浮而大。於指面之下。其形中斷。又如流水不相續。或如瀉漆之形。斷而倒收。又似弦而軟。素太脈訣云。芤脈之狀。中空弦散。主吐血嘔血衄血。男子失精。婦人胞漏半產血崩。又曰其狀弦大。弦則爲減。大則爲芤。弦芤相搏。此名爲革。金刑木而傷肝也。芤而滑。嘔吐甚則亡血。芤而數。陽陷陰中。血妄行。芤而急。風冷入血。

下血如豚肝。臍腹痛。死不治。芤而弦。因失血致勞傷。芤而微。或散。久成血枯。

濡脈之狀。極軟弱。如以指按水中綿。如有如無。（太素脈訣云。諸部脈并。按之極小。）爲陰陽俱不足。濕冷霧露之氣所傷。爲病。頭重。如以濕熱之物裹首。大筋軟短。小筋弛長。爲痿弱。骨不能立。又爲亡津液。精神不收。（十便良方云。精神乾急。或偏枯。血脈痺。得之風冷濕氣也。餘同前。）又爲脛痠枯細。手足常厥冷。肉理不密。

微脈之狀。極微。或似有似無。爲氣血不足。爲虛憊。亡血亡汗。小便數。或曰濁。若微數。爲陰虛客陽內熱。穀氣少也。若在尺部。腎脂枯。髓不滿。骨若在左關。則肝氣血不足。目視瞋瞋。筋緩弱。若在右關。則虛滑泄注。穀不化。腸鳴。及漿粥不入胃。若在右寸。則爲肺損。胃寒。口中如含霜雪。欬嗽肌疎。不可以風。短氣。若在左尺。爲心虛恍惚。憂思不樂。多恐。如人將捕之。若六部俱微。則陽不及四肢。足脛冷。手足厥。常欲湯火煖之。陳無擇三因方云。微者極細而軟。似有若無。與人迎相應。則風暑自汗。與氣口相應。則微陽脫泄。入裏病。

脈微爲虛。爲弱。爲劫。爲嘔。爲泄。爲亡汗。爲拘急。微弱。爲少氣。爲中寒。

革脈之狀。渾渾革至如湧泉。謂出而不返也。爲陰氣隔陽。又爲溢脈。蓋自尺而出。上於魚際。亦謂之離經。無根本也。又覆脈之狀。自寸口下退過而入尺。皆必死之脈也。

伏脈之狀。重於沉。指下尋之方得。蓋時見時隱也。（太素脈訣云。伏脈之狀。其形沉伏。隱隱其位。）此陰陽之氣相伏也。或陰中伏陽。陽中伏陰。脈疾爲伏陽內熱。身雖寒而不欲蓋衣。脈遲小有來無去。此伏陰在內。陽氣不得入也。其人身雖熱而但欲覆被向火。脈實者有伏氣在內。濇者有動氣。在左則左病。在右則右病。在尺則居臍上下。

居膺上爲逆居臍下爲從。

牢脈之狀如弦而實。尋之則散。（太素脈訣云。指下尋之不動。）爲五勞六極七傷之病。若加數疾則發熱。加短遲則發寒。疾遲不常。則寒熱支體迫急。情思不樂。

實脈之狀舉按有力。重按隱指。愊愊然氣不利。亦主伏陽在內。燕熱滂傺。胃氣壅塞。爲內癰。實數爲三焦閉熱。大便秘實滑爲癖飲。癥瘕留聚之病。實大爲氣盛閉塞。（太素脈訣云。實大作實洪。）實沉爲藏府氣不通。帶短。（太素脈訣云。實而短。）爲宿穀不化。

弱脈之狀小而無力。爲精不足。短氣。表裏俱衰。爲暴下。陰併於陽。汗出不止者死。又爲脚弱筋緩。足不能履地。惡寒不可出風。

細脈之狀細細似線。（太素脈訣云。其形細微。）陰氣勝陽也。又爲手足寒。氣少慘慘不舒暢。又血不榮於四肢。謂寒則澀而不流行也。（太素脈訣云。又主冷痺癉。）

緩脈之狀不遲不疾。一息四至。往來得中。實得　上氣（太素脈訣云。緩脈之狀如柳葉也。）緩却爲病。四肢不收。受濕而痺。緩而沉。脾氣滯。志意不舒展。氣痞多噎。緩而濇。肌肉不仁。津液不流行。榮衛失度。因以致風。緩而微爲消氣。緩而滑爲熱中。多食。緩而短。穀不化。爲溏泄。緩而浮。爲風癉曳。陳無擇三因方云。緩者浮大而軟。去本微遲。與人迎相應。則風熱入藏。與氣口相應。則怒極傷筋。緩而在下。爲風。爲寒。爲弱。爲痺。爲痓。爲不仁。爲氣不足。爲眩暈。緩而滑。爲熱中。緩而遲。虛寒相搏。食冷則胸痛。

濇脈之狀。往來極濇。如水不能流。或聚於指下。或綿綿如瀉漆。斷而倒收。又似止非止。（太素脈訣云。濇脈之狀。如刀口。到指。不離其所。）主男子亡血失精。婦人胎妊不成。月候凝澀。或崩傷不止。五帶敗血在腹。或血痕成形。筋急寒痺。浮濇爲肺病。咯血欬嗽。虛勞濇中時弦爲金木相剋。脇下痛。不得臥者死。在左寸。爲心痺。寒慄病積漏血。在左尺。爲病小腹積氣。在右關。則病心腹時滿。在左關。則病筋急積寒。

結脈之狀。大小不定。往來不拘。數至時一止。主氣不流行。腹中癥癖氣塊成形。或因大病後亡津液。亡血。或驚恐神散而精不收。或夢漏亡精。又多慮而心氣耗也。若無是因。則其人壽不過一二年。

代脈之狀。其來如斷絕而相待。其息以至時搏而動。主血氣虧損。或驚憂積甚。形氣不相得也。

滑脈之狀。指下如水之流。或如轉珠而滯礙。（太素脈訣云。不緩不洪不實。如珠之形。）主嘔吐。主飲。滑而弦細者爲支飲。欬逆。倚息。面浮腫。滑而緊。停寒積飲。吞酸。腸間漉漉有聲。滑而弦。留飲在胃。頭痛而眩。滑而數。爲中喝。甚則爲痙。手足瘛瘲搐搦也。滑而緩。熱中消穀引食。滑而細沉。爲消渴。帶微。爲消中。不渴。小便數。滑實。爲氣盛。上熱。滑大而數。爲心氣熱。越多汗。滑而微小。爲多盜汗。在尺滑。爲狐風疝。在右手寸口。爲肺風疝。在右關。則爲脾風疝。在左關。則爲肝風疝。

緊脈之狀。如按繩纔指。三部通度。與弦相似而有力。舉按皆有餘。主中寒。腹痛切急。在寸口。則中寒口噤。頭痛惡寒。欲得覆被火炙。在關上。則胃冷吞酸。中脘臍腹痛。下利筋寒。或轉筋霍亂。欬嘔膽汁。緊數爲冷熱痢。下膿血。或身熱。飲食如故。有病處則結癰疽。在尺爲寒疝痛。

促脈之狀。自尺上寸口促急。有來無去。（太素脈訣。作有來時止復來。）此榮衛無度數。陰氣促陽也。又腎氣離經。升而不降。又爲無陰而陽無以繫也。若時氣促數。上出寸口。此陽併於血病赤斑。十死一生。若脈見斷絕。爲黑斑。獨陽攻藏氣絕。死不治。

動脈之狀。鼓動而暴於指下。不常。氣血相乘。搏擊而動也。或鼓於陽。則一陽爲鈎。如夏脈之盛。或鼓於陰。一陰爲毛。如秋氣之急切勁烈。鼓陽勝而急曰弦。陰緩而陽急也。鼓陽至而絕曰石。陽辟而陰孤也。陰陽相過曰溜。氣相鼓作而動也。

弦脈之狀。如張弓弩弦。應指有力。重按則軟弱。（太素脈訣云。狀如琴弦。）主春氣。主肝藏。主虛。主痰。主瘧。主勞。弦而微。氣不足。筋緩不榮。弦急似數非數。綿綿之狀。勞傷氣促急。四肢煩厥。無首尾而促疾。虛勞不足。弦弱而疾。夜多盜汗。弦知而大。榮衛勞傷。內急外緩。兼數則熱。目視瞧瞧。血不足也。兼遲則寒。筋脈急攣。弦膚因失血。女子則月閉。血瘕。弦緊爲虛寒。暴急寒疝。少腹痛。面青。下利。弦遲而濇。出入無首尾。爲寒閉。血少。筋乾。急。（太素脈訣。作弦而急。）或偏枯。血脈痺。得之風冷濕也。（一便良方云。沉而微。五藏氣衰。中痿不能起。）

短脈之狀。往來極短。不待息盡而回。或無首尾。但見於指面。亦不待氣來而至。其人短氣息。或不能長息。又爲大下。脫氣。又主久病。

長脈之狀。往來指下。息隨而盡。其有餘。如操帶物之長。（太素脈訣云。長脈之狀。往來至長。）亟賦氣強勝血。而氣擁。其人壽。若加大而數。爲病。陽盛內熱。當利三焦。

# 全生指迷方卷二

## 寒證

論曰若其人洒淅惡寒但欲厚衣近光隱隱頭重時痛鼻窒塞濁涕如膿欬嗽動輒汗出或無汗甚則戰慄此由寒中於外或由飲冷傷肺胃內外合邪留而不去謂之感寒寒從外至者兩手寸口脈俱緊或但見於右寸寒從內起者其脈遲小無汗者小青龍湯主之小汗者溫肺湯主之

### 小青龍湯

五味子　細辛去苗　乾薑　半夏湯洗七遍　甘草炙各一兩

右爲散每服五錢水二大盞薑三片棗一箇擘破同煎至八分去滓溫服

### 溫肺湯方缺

若陰寒積冷心腹大痛嘔逆惡心手足厥冷心胷不快腰背疼痛良薑湯主之

### 良薑湯

高良薑一兩剉炒　官桂去皮一兩　當歸去蘆一兩剉炒　乾薑炮一塊

人參去蘆一兩　吳茱萸七錢半炒　白朮一兩　附子半兩炮

右爲散每服二大錢水一盞半入生薑五片煎至七分去滓空心服

若但寒頭重動眩暈肌肉痛牽急不得轉側發發汗出惡寒小便難大便反快短氣足寒或時咽痛微熱此由寒濕客搏經脈不得發泄其脈遲緩而小弦附子湯主之除濕湯亦主之

附子湯

附子（一箇炮去皮臍）　白朮（一兩炒）　茯苓　白芍（各三兩）　人參（二兩）

右爲散每服二大錢水一盞半入生薑三片煎至七分去滓空心服

除濕湯方缺

熱證

論曰陰不足則陽偏陽偏則發熱若熱從背起自手足漸漸周身口舌乾燥欲飲食而不能此由陰氣虧少少水不能制盛火諸陽起於四末循行於背陰不能斂陽陽氣獨行所以發熱或晝發而夜寧或夜發而至旦即消其脈虛疾而小芍藥黃耆湯主之

芍藥黃耆湯

芍藥（三錢）　黃耆　甘草（炙）　青蒿（陰乾各一兩）

右爲散每服五錢水二大盞煎至一盞去滓食後温服

若熱從腹起上循胸腋繞頸額初微而漸至大熱發無時遇饑則劇中脘不利善食而瘦其色蒼黃肌肉不澤口唇乾燥由脾氣素弱會因他病憚服熱藥入於脾脾熱則消穀引飲善消肌肉其脈濡弱而疾參

橘丸主之若嗽者用加減法及炙脾腧百壯

參橘丸

橘皮三兩洗　麥門冬去心　人參去蘆各一兩

右爲末煉蜜爲丸如梧桐子大食前米飲下三十丸若嗽加五味子一兩

若熱從腹中或從背起漸漸蒸熱日間劇夜漸退或寐而汗出小便或赤或白而濁甚則頻數尿精夜夢鬼交日漸羸瘦由思慮太過心氣耗弱陽氣流散精神不藏陰無所使治屬虛勞大建中湯

大建中湯

芍藥六兩　黃耆　遠志去心　當歸洗　澤瀉各三兩

龍骨　人參　甘草炙各二兩

右爲散每服五錢水二盞棗二箇擘破薑五片同煎至一盞去滓食後溫服腹中急加飴如棗大

若自腰以上發熱熱及則汗出出已而涼移時如故復加昏黑腹中膨脖其氣上攻時時欬嗽引脇下牽痛睡則驚悸其脈弦急疾由外寒客搏內冷相合寒則氣收而水液聚內化成飲醫以熱藥攻寒寒閉於內熱增於上陽氣不下行故散越於上發而爲熱散而爲汗汗多亡陽心氣內虛故令驚惕治屬飲家以旋覆花丸主之

旋覆花丸

旋覆花　桂心　枳實・麩炒　人參各五分・　乾薑　烏頭炮・去皮・

芍藥　白朮各六分・　伏苓　細辛・去苗　狼毒

礬石・火煅一伏時・各八分・甘遂三分・炒・　大黃・濕紙裹・煨・　黃芩

葶藶・炒　芫花・炒　橘皮・洗　吳茱萸・炒　厚朴・去皮・薑汁炙・各四兩・

右爲細末。煉蜜爲丸如梧桐子大。米飲下三丸。未效加至七丸。小兒黃米大二丸。若熱起骨間煩疼。手足時冷。早起體涼。日晚卽熱。背脅牽急。或骨節起凸。足膝酸弱。由陰不足。而陽陷陰中。熱留骨髓。髓得熱則稀。髓稀則骨中空虛。陰虛水少。脂枯故蒸起。其脈沉細而疾。治屬骨蒸。補髓丸主之。

補髓丸

生乾地黃日乾・三兩・　乾漆半兩・碎・炒令烟盡・

右爲末。煉蜜爲丸如梧桐子大。飲下三十丸。空心臨臥服。若自胷以上至頭發熱。口鼻氣色時如烟薰。日瀝咽燥。唾如凝脂。時欬。毛竦。大便不利。小便赤。由肺不調。邪熱薰上焦。其脈疾大。先服桔梗湯。熱不退者。五味子湯主之。

桔梗湯

桔梗一兩　人參　麥門冬・去心　甘草炙・各半兩・　小麥・一合

右㕮咀水三升煎至一升去滓分三服

五味子湯　指南方治發熱不退

柴胡去苗洗四兩　半夏湯洗七遍一兩一分　黃芩　五味子　赤伏苓分兩原缺

右爲散每服五錢水二盞薑五片棗二箇擘破同煎至一盞去滓温服若但熱不欲日晡尤甚口中勃勃氣出耳無所聞晝多昏睡晚卽浪言喜冷小便赤澁大便不通由三陽氣盛蘊於經絡內屬府藏或因他病而致疾其脈短疾而數柴胡芒硝湯主之

柴胡四兩洗去苗　黃芩　甘草炙　赤伏苓各一兩半　半夏湯泡七遍一兩一分

右爲散每服五錢水二盞生薑五片棗二箇擘破同煎至一盞去滓入芒硝一錢攪和温服以大便利爲度

若身大熱背微惡寒心中煩悶時時欲嘔渴不能飲頭昏重痛惡見日光遇涼稍清起居如故由飲食失時胃中無穀氣熱蓄於胃中中脘熱則三陽不下降而上聚於腦又胃主陽明經爲惡熱其脈虛大而數久則細小謂之中暑初卽服好茶一杯立愈不卽治之留而在胃別致他病牛蒡竹茹湯主之

生蒡竹茹湯

竹茹雞子大　人參半兩　葛根半兩　生薑切一錢

右爲散。水三盞。煎二盞。去滓。分二服。不拘時。

若間日發熱。發必數次。頭痛拘倦。由肺素有熱。氣盛於身。厥逆上衝。中氣實而不外泄。其氣內藏於心。外舍於分肉之間。令人消爍脫肉。其脈弦大而數。謂之癉瘧。柴胡桔梗湯主之。

柴胡桔梗湯

柴胡（去苗洗）八錢　芍藥　人參　各二錢　半夏（湯洗七遍）二錢半　甘草（炙）二錢　桔梗二錢

右咬咀。水二升。生薑十片。棗二箇。擘破。同煎至一升。分三服。去滓服。大熱者去芍藥桔梗。用黃芩三錢。卽名小柴胡湯。

若身熱汗出煩滿。不爲汗解。由太陽之經。先受風邪。與熱相搏。腎氣厥則煩滿。謂之風厥。澤瀉湯主之。

澤瀉湯

澤瀉半兩　白朮　防風各二兩　石膏研　赤茯苓各一兩

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。溫服。

若四肢發熱。逢風如炙如火。由陰不勝陽。陽盛則熱起於四支。少水不能滅盛火。而陽獨治於外。以菟絲子丸主之。

菟絲子丸

兔絲子（先於白內杵百下。）　五味子（各一兩。）　生乾地黃（一兩。）

右爲末。煉蜜和丸如梧桐子大。飲下三十粒。食前溫服。

若發熱耳暴聾。頰腫脇痛。脈不可以運。由少陽之氣厥而熱留其經。宜小柴胡湯。若口乾溺赤。腹滿心痛。由熱留於手少陰之經。其氣厥也。赤茯苓湯主之。

赤茯苓湯

赤茯苓（四兩。）　甘草（生。一兩。）　木香（半兩。）

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。溫服。（不拘風食。）

論曰。若其人翕翕如熱。淅淅如寒。無有時度。支節如解。手足酸痛。頭目昏暈。此由榮衛虛弱。外爲風邪相乘。搏於陽則發熱。搏於陰則發寒。久不治成勞氣。荊芥散主之。

荊芥散

荊芥穗　人參　白朮　當歸（切細焙。）　黃耆

芎藭　桂（去皮。各一兩。）　柴胡（去苗。二兩。）　甘草（炙。半兩。）

右爲末。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。溫服。

若忽然牙關緊急。手足瘈瘲。目直視。此風客血經。謂之風痙。脈緊大者不可治。獨活湯主之。

獨活湯

獨活半兩劉　荊芥穗一兩

右以水三盞煎荊芥汁至一大盞再入獨活煎一半去滓溫服凡用獨活紫色有成臼子者蓋羌活極大而老者是尋常所用白色者乃老宿前胡也愼不可用

又方

煎荊芥濃汁於盆中坐病人於上薰蒸然然淋洗之

若寒熱如瘧不以時度腸滿膨脖起則頭暈大便不通或時腹痛胸膈痞悶此由宿穀停留不化結於腸間氣道不舒陰陽交亂備急丸主之

備急丸

大黃濕紙裹煨　巴豆去皮心及油　乾薑去皮等分

右爲細末煉蜜爲丸如豌豆大每服一丸米飲下羸人服一丸如菉豆大以便快利爲度

風濕

論曰若身體疼心煩口燥欲得水而不能飲額上微汗背強欲得覆被向火其脈浮虛或日晡發熱或身重汗出而脈但浮或掣痛不得屈伸近之則痛極短氣或身微腫或發熱面黃而喘鼻塞而煩脈大自能飲食此由汗出當風或因冒濕冷復遇風邪之氣閉固腠理病名風濕麻黃加朮湯主之

日晡發熱者薏苡仁湯主之。
掣痛不得屈伸者甘草附子湯主之。
鼻窒塞氣不通者瓜蒂散主之。
惡風身體重者防已湯主之。

麻黃加朮湯

麻黃（去根節）三兩　桂心　二兩　甘草（炙）一兩　杏仁（湯洗去皮尖）半兩　白朮　四兩

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服。

薏苡仁湯

麻黃（去根節）三兩　杏仁（去皮尖）半兩　甘草（炙）　薏苡仁　各一兩

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服。

甘草附子湯

甘草（炙）二兩　附子（炮去皮臍）一兩

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服。

瓜蒂散

瓜蒂　細辛（去苗）　藜蘆（去苗）各等分

右爲細末。每用半字許內鼻中。以氣通爲度。

防已湯

防已　四兩　黃耆　四兩　甘草　炙　二兩　蒼朮　去皮　三兩

右爲散。每服五錢。水二盞。薑二片。棗一箇。擘破。同煎至一盞。去滓。溫服。

瘧疾

論曰。寒熱之病。或寒已而熱。或熱已而寒。或寒熱戰慄。頭痛如破。身體拘急。或欠。渴欲飲冷。或晝時而發。或間日而作。至期便發。發已即如常。此謂之瘧。瘧脈自弦。弦數多熱。弦遲多寒。此皆得之於冬中。風寒之氣。藏於骨髓之中。至春陽氣大發。邪氣不能自出。因遇大暑而後與邪氣相合而發。常山湯主之。

常山湯

常山　知母　甘草　炙　各二兩　麻黃　去節　一兩

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。溫服。以糜粥一盃助。取汗爲度。熱多者。宜解之。栝樓湯主之。

栝樓湯

栝樓根　四兩　柴胡　去苗　八兩　人參　黃芩　甘草　炙　各三兩

右爲末。每服二錢。水二盞。生薑三片。棗一箇。擘開。煎至一盞。去滓。溫服。

寒多者宜温之薑桂湯主之

薑桂湯

乾薑　牡蠣火煅通赤　甘草炙各二兩　黃芩二兩活人書用三兩
柴胡去苗八兩　栝樓根四兩　桂去皮取心二兩

右爲末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服不拘時候

寒熱等者宜調之鼈甲湯主之

鼈甲湯

鼈甲湯浸刮令淨醋炙　白朮　常山　桂去皮　柴胡去苗各一兩
牡蠣煅赤二兩火

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服

痺證

論曰若始覺肌肉不仁久而變生他證病名曰痺此由風寒濕三氣客於經絡舍於血脈搏於榮衛故令皮膚痺而不仁有熱則肌肉骨節煩疼有寒則冷以春得之在筋夏得之在脈秋得之在皮冬得之在骨四季得之在肌肉又久而不去各傳其藏筋痺不已舍之於肝夜臥則驚飲食多小便數上爲引如懷妊脈痺不已舍之於心其脈不通煩滿心下鼓暴上氣肌痺不已舍之於脾其狀四肢懈惰發渴嘔汁上爲

大寒皮痺不已舍之於肺其狀煩滿而喘嘔骨痺不已舍之於腎其狀善脹尻以代踵脊以代頭右證雖多必先肌肉不仁其始治當以增損小續命湯證狀小不同者當依本法病久入深魯公酒主之增損小續命湯方缺

魯公酒

茵芋　川烏頭炮去皮臍　蹶蹋花　天雄炮去皮臍　防巳
石斛去根各一兩　細辛去苗　栢子仁　牛膝去苗　甘草炙
通草　桂去皮取心　山茱萸　秦艽去苗土　黃芩
茵蔯蒿　躑麥　附子炮去皮　杜仲去皮　澤瀉
王不留行　石楠葉　防風　生乾地黃各半兩　遠志去心

右咬咀酒四斗漬十日每服一合常令酒氣相續

若胃乾而渴肌肉不仁由居處卑濕以水爲事肌肉濡漬痺而不仁是謂肉痿罌粟湯主之

罌粟湯

罌粟不計多少

右研細末煮稀粥入蜜飲之大解金石毒

若一邊足膝無力漸漸瘦細肌肉不澤上牽脇肋下連筋急不能行步此由大病之後數亡津液血少不

榮氣弱不運。肝氣虧損。無血以養筋。筋不榮。則乾急而痛。亦不能舉。活血丹主之。

活血丹

乾地黃二兩　當歸洗　芍藥　續斷　白朮各一兩　右爲細末。酒糊爲丸。如梧桐子大。酒溫下三十丸。食前服。加至五十丸。如痛甚足痿不能行。去朮加杜仲一兩。乳香。蕨靈仙。木鼈子仁。草烏頭。白芥子。各半兩。

鹿茸丸

鹿茸去毛。切作片子。酥炙。五兩　乾地黃二兩　牛膝二兩　菟絲子揀淨。酒浸透。乘潤擣爛。焙。二兩　杜仲去粗皮。擣爛。酒拌。炒乾。二兩　附子炮。去皮臍。半兩　乾漆半兩。炒。烟盡爲度　右爲細末。酒糊爲丸。如梧桐子大。飲下三十丸。食前服。若始覺脚弱。速灸風市三里二穴。各一二百壯。若覺熱悶。愼不可灸。大忌酒麵房勞。風市穴。使病人平立垂兩手。合手著腿中指尖頭。卽是穴。三里穴。在足膝蓋下三寸外廉。按之陷中是。又法。以指深按之。則足趺陽脈不見爲準。

勞傷

論曰。古書有五勞六極七傷。皆由勞傷過度。或五藏六府互相尅賊。一藏偏損。五行逆伏。以至盡絕。皆謂之虛勞也。

若日頓羸瘦。短氣腰背牽急。膝脛酸痿。小便或赤或白而濁。夜夢紛紜。或夢鬼交。翕翕如熱。骨肉煩疼。由房勞過度。或思慮過多。皆傷神耗精之由。得之心腎。其脈細促。大骨枯者不治。微弱者可治。脈大數甚。不能食者死。大建中湯主之。

大建中湯（見前發熱門。）

○氣病

論曰。百病皆生於氣。其始必由喜怒悲憂驚恐。由是變生。形證不一。若其氣起於一邊。或左或右。循行上下。或在肌肉之間。如錐刀所刺。其氣不得息。令人腹中滿。由驚恐恚怒。或冒寒熱。留而不去。爲鬱伏之氣。因氣流行。隨經上下。相搏痛。久久令人痞悶。其脈短濇。謂之聚。○七氣湯。趣痛散主之。

七氣湯　楊仁齋直指方云。治七情相干。陰陽升降。氣道壅滯。攻衝作疼。

京三稜　蓬莪茂　青橘皮　香附子（去毛）　陳橘皮（洗）

桔梗　蘇香葉　桂（取心）　益智（各一兩半）　甘草（炙）（三錢。明氏經効方。有沉香半兩。無陳橘皮。）

右爲散。每服五錢。水二盞。生薑二片。棗二枚。煎至一盞。食前温服。

趣痛散　可用方云。治氣搏作痛。肌肉之間如錐刀所刺。胸膈痞悶。

蓬莪茂（炮。別爲末炒。）　桂心（各一兩。）　檳榔　附子（炮。去皮臍。）　細辛（去苗。各半兩。）

芫花（一錢。）

右除芫花外共爲末每服三大錢水一盞煎至七分去滓調芫花末一字温服

若心下似硬按之即無常覺膨脹多食則吐氣引前後噫氣不除由思慮過多氣不以時而行則氣結又曰思則心有所存神有所歸正氣留而不行其脈澁滯謂之結氣參橘丸主之

參橘丸

橘皮四兩洗　人參一兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大米飲下三十丸食前服

若咽中如核噦之不下吐之不出久不治之漸妨於食或由思慮不常氣結不散或因飲食之間氣道卒阻因而留滯因氣者謂之氣噎其脈緩澁因食者謂之食噎其脈短澁氣噎嘉禾散主之食噎神麴丸主之

嘉禾散方缺

神麴丸

神麴兩炒一　橘皮兩洗二

右爲細末煉蜜和爲丸如雞豆大每服一粒含化嚥津

若痛而遊走上下無常處脈亦聚散或促或濇謂之遊氣茂香散主之不止者延胡散主之

茂香散

蒺藜茂炮一兩　人參一分　木香一錢

右爲細末醋湯調方寸匕

延胡散

延胡索炒　當歸洗等分

右爲細末醋湯調方寸匕

若白咽嗌以下至臍左右氣各不相通氣上奔急攻右臂痛如斧槌肌肉日消粥粥不下心中懊悶由肺經本受寒邪留於右邊以肺左右或因以大熱藥攻寒寒本在於經而不能散發於是火氣但逼於肺肺燥則氣上迫但解藥毒然後理肺先宜炙肝散後宜理氣湯

炙肝散

牡丹皮　柴胡　芍藥各一兩　白朮二兩

右爲細末用猪肝三指許薄批糝藥末二錢慢火炙熟細嚼米飲下食前服

理氣湯疑即前七氣湯

栢子仁丸　史載之指南方多楮實一兩治臂痛不能屈伸筋脈攣拘

栢子仁炒研　乾地黃各二兩　茯苓　枳實麩炒　桂取心

五味子　附子炮去皮臍　石斛去苗　鹿茸去毛截作片子酥炙　酸棗仁

覆盆子　沉香　黃耆各一兩。

右爲細末。煉蜜和丸如梧桐子大。酒下三十丸。空心服。

若腹脇有塊。大小成形。按之不動。推之不移。久久令人寒熱如瘧。咳嗽。面目浮腫。動輒微喘。日就羸瘦。由暴怒或驚恐。氣上而不下。動傷於肝。氣結聚成形。始得之在肝。其脈牢大而結。不傳可治。沉香煎主之。

沉香煎

石斛五兩　椒去目炒出汗　附子炮去皮臍　秦艽去土　木香　檳榔　黃耆各二兩。

柴胡去苗　沉香　麝甲煮刮去筋膜炙

右爲末。先用枸杞根。新者十斤。淨洗搥碎。好酒二斗。煮至七升。取出枸杞。別用好酒三升。拍洗令淨。漉去滓。濾過。併於前煎酒內。更入熟蜜四兩。再熬成膏。和藥末丸如梧桐子大。飲下二十丸。食前服。

血證

論曰。諸陽統氣。諸陰主血。陰盛則陽虧而陽病。陽盛則陰虧而陰病。陽氣侵陰。血失常道。故或吐或衄。或從口或從鼻。若暴出而色鮮。心煩燥悶。時欲引飲。出至三斗。陽入於陰也。血得熱則流散。譬如天地之經水。天暑地熱。則經水沸溢而壅起。故有內衄肺疽。其證大同而小異。其脈洪數者爲逆。微小者爲順。宜梔子蘗皮湯。煎金湯。大熱者宜地黃煎。

若吐血時。先聞腥臊。鼻出清液。胃脇支滿。妨於食。目眩。時時前後血。此由素經大奪血。或醉入房中。氣竭

傷肝。女子則月事衰少不來。病名血枯。梔子檗皮湯主之。

梔子檗皮湯

黃檗　梔子各一兩　甘草半兩

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。溫服。

煎金湯

金花幷莖葉陰乾。不拘多少。

右濃煮汁。頓服立定。

地黃煎

生地黃汁半斤　大黃末一兩

右將地黃汁熬耗一半。內大黃末同熬。候可丸。如梧桐子大。熟水下五粒。未效。加至十粒。若吐血。服湯後轉加悶亂煩躁。紛紛欲嘔。顛倒不安。由胸上有留血。其脈沉伏。急須吐之。人參散主之。

人參散

人參蘆

右爲末。水調下一二錢。

若血隨嘔出。胸中痞悶。嘔畢則目睛痛而氣怒。由怒氣傷肝膽。血隨嘔出。竹皮湯主之。

竹皮湯

青竹皮　甘草炙　芎藭　黃芩各一　當歸洗各六分

芍藥　白朮　人參　桂心兩

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服

若先吐血血止後嗽嗽中血出如線痛引脇下日漸羸瘦由悲憂傷肺肺主諸氣血常隨之氣傷則血無以運故横流而暴出後隨病而上下也其脈緩小者可治細數加急者不可治黃耆湯主之

黃耆湯

黃耆蜜炙一兩　白朮炒二兩　人參　甘草炙各一兩　白芍一兩

陳皮半兩　藿香半兩

右爲散每服四錢水一盞半煎至七分去滓温服

若衄血吐血發作無時肌肉減少由氣虛弱或從高墮下勞傷所致其脈虛弱當補陰平陽阿膠散主之

阿膠散

阿膠蛤粉拌炒一兩半　杏仁炮去皮尖七錢　馬兜鈴焙　牛蒡子炒各一兩

甘草炙　糯米一兩

右爲細末熟水調下一二錢

若吐血腹中絞痛汗自出胸中悶由飲食傷胃胃氣不轉氣上衝胸所食之物與氣迫壅因胃裂白朮湯主之

白朮湯方缺

# 全生指迷方卷三

## 諸積

論曰若腹中成形作塊按之不移推之不動動輒微喘令人寒熱腹中時痛漸漸羸瘦久不治之多變成水虛勞亦由憂思驚恐寒熱得之陰陽痞滯氣結成形其脈結澀謂之積氣萬安丸主之

萬安丸

大戟炒　甘遂炒　牽牛炒　五靈脂各半兩　芫花炒一分

膽礬一錢研　細墨燒一錢研　巴豆去皮出油一錢　芫青四十箇去頭去翅　斑猫二十箇去頭去翅

石膏細研一分　延胡索炒半兩　吳茱萸炒半兩

右爲細末白麵糊爲丸如菉豆大生薑橘皮湯下一粒日二服病去六七分即住服　史氏指南方有續隨子郁李仁信砒各一分無延胡索巴豆　袁當時大方有砒一分無斑猫芫青巴豆

若左脇下如覆杯有頭足久不已令人發痰瘧寒熱欬或間日一發由肺病傳肝者當傳脾脾乘王而不受邪其氣留于肝故結而爲積其脈澀結麝香丸主之

麝香丸

蓬莪茂炮一兩　桂心　當歸　人參各半兩　細辛去苗

川烏頭（炮・去皮臍）　巴豆（一分・去皮・出油）　各一分

右研細末。白麵糊爲丸如菉豆大。食後飲下三粒。史氏指南方。無蓬莪茂有芎藥一兩。

若心下如盤。久不已。令人四肢不收。發黃疸。飲食不榮肌膚。始由肝病傳脾。脾當傳腎。腎乘王而不受邪。氣留於脾。其脈緩濇時結。謂之痞氣。三稜煎主之。孫氏仁存方云。兼治食癥酒癥血蟲氣塊血瘕時發刺痛。婦人血分男子脾氣橫泄。

三稜煎

京三稜（剉）　蓬莪茂（各四兩・剉）　芫花（一兩）

右用米醋三升。煮令醋盡。獨炒芫花令乾。餘二味切片子。焙乾。同爲末。白麵糊爲丸如豌豆大。橘皮湯下三粒。以知爲度。

若從少腹上衝心胸。咽喉發痛。如狒肝狀。發作欲死。由脾病傳腎。腎當傳心。心乘王而不受邪。氣留於腎。結而爲積。其脈沉結。謂之賁狒。賁狒湯主之。

賁狒湯

甘草（炙）　川芎　半夏（湯洗七遍）　芎藥　黃芩（各二兩）

葛根　甘李根皮（各五兩）

右爲散。每服五錢。水二盞。薑五片同煎至一盞。去滓。溫服。史氏指南方。加當歸一兩。孫氏仁存方

加乾薑一兩。一方當歸二兩無葛根。

若脈大而散。時一結。謂之伏梁。伏梁丸主之。

伏梁丸

青皮（白馬尿浸三日令軟透。切。三十箇。）　巴豆（去皮。十五箇。與青皮同炒乾。去巴豆不用。）　羌活（半兩。）

右爲末。白麵糊爲丸如棊豆大。飲下五粒。未知漸加至十粒。

若身體及髀股脛皆腫。環臍而痛。不可動。動之爲水。亦名伏梁。椒仁丸主之。

椒仁丸

五靈脂　吳茱萸（炒。各一錢。）　延胡索（炒。半兩。）　芫花（醋浸一宿。炒。一分。）

續隨子（去皮。研。）　郁李仁（去皮。研。）　牽牛（半兩。炒熟。各半兩。）　石膏（火煅。一分。研。）

椒仁（一錢。）　甘遂（炒。一錢。）　附子（炮。去皮臍。）　木香（各半兩。）

胰礬（研。）　砒（研。）

右爲細末。白麵糊爲丸豌豆大。橘皮湯下一粒。早晨日午臨臥服。如婦人血分。則去木香。加斑猫、芫青各三十枚。去頭足翅。炒。當歸半兩。

諸痛

論曰。諸心腹痛者。或外邪來客。或氣相干。其卒然痛而卽止者。此寒氣客於脈外。得寒則縮踡。絀急。外引

小絡得熱即止宜先用熨法後以良薑散主之

熨法　指南方云治心腹痛卒然而止遇寒再發

鹽半斤炒極熱

右以舊帛包熨痛處指南方云漸去至一重

良薑散

高良薑五兩　厚朴去皮薑汁塗炙二兩　當歸　桂心各三兩

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服

若腰者腎之外候足太陽經之流注如痛連小腹不得仰俛慳慳短氣由腎氣虛弱有所不榮補腎散主之

補腎散

杜仲去粗皮杵碎酒拌炒焦一兩　桂去皮　牡丹皮各半兩

右爲末每服三錢用猪腎一箇批開糝藥在內入鹽少許以線扎定水煮熟空心食之

若隱隱腰痛以熱物熨痛處即少緩由處卑濕復爲風邪傷足太陽之經其脈緩澁白朮散主之

白朮散

白朮二兩　芍藥三兩　桂去皮　附子炮去皮臍各一兩剉

右爲細末。溫酒調二錢匕。食前服。

若腰痛不能轉側。由勞役動傷經絡。或從高墮下。氣滯於腰。正氣流行。相搏則痛。其脈沉大小不常。謂之腎腰趁痛丸主之。

趁痛丸 諸氣門見趁痛散。

若腰如錐刀所刺。大便黑色。小便赤黑。此留血滯於腰間。謂之血瀝腰痛。其脈濇。當歸丸主之。

當歸丸

當歸 三兩。剉。　水蛭 好者。炒三十箇。　桃仁 去皮尖。三十個。炒研。

右爲末。酒糊爲丸。如梧桐子大。酒下十粒。未知。加至三十粒。

若腰冷。腹重如帶五千錢。如坐於水。由腎經爲陰濕所逼。復受風冷。久不治。變成水病。腎著湯主之。

腎著湯

甘草 炙。　乾薑 各二兩。　白茯苓 各四兩。

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。食前溫服。

若腰脊不舉。由遠行勞倦。逢大熱而渴。陽氣內伐。熱舍於腎。水不勝火。則骨枯而髓減。蓋陽明併腎。則腎脂枯而宗筋主束骨而利機關也。是謂骨痿。菟絲子丸、補腎散主之。

菟絲子丸

菟絲子　揀淨・酒浸透・搗爛・焙・二兩・　牛膝　酒浸・一兩・　杜仲　去粗皮・炸碎・酒拌炒焦・三兩・

乾地黃　焙・二兩・　蓳薢・一兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大飲下三十粒食後服。

補腎散　見前。

若脇痛不得息痛則汗而汗出由邪客於足少陽之絡屬膽宜灸足小指次指爪甲上與肉交處七壯竅陰二穴也。

若臂外廉痛手不及頭心煩喉痺者由邪客於手少陽之絡以針刺手大指次指之端去爪甲如韭葉令血出而止。

若臂痛不能屈伸此邪客於臂掌之間取腕踝骨後以指按之極痛刺之留二呼急出針或灸。

若筋拘攣背急痛引脇下從項推下夾脊按之應手痛者於其上灸七壯未定加至十四壯。

若痛引小腹由寒氣客於厥陰之脈或脇肋相引腎肝脈弦大久成寒疝桂枝烏頭湯主之。

桂枝烏頭湯

桂心・三兩　芍藥・三兩　烏頭・炮・去皮臍・二兩半・　甘草・炙・二兩・

右爲散每服五錢水二盞薑五片棗一枚同煎至一盞去滓入蜜半匙許再煎一二沸稍熱服。

眩暈

論曰。頭眩之狀。謂目眩旋轉。不能俛仰。頭重不能舉。目不能開。閉則不能視物。（史氏指南方云。戞物如反。或如浮水。）或身如在車船上。是謂徇蒙招尤。目瞑耳聾。下實上虛。過在足少陽厥陰。由肝虛血弱。則風邪乃生。蓋風氣通於肝。又曰。諸風掉眩。皆屬於肝。左手關脈虛弦。謂之風眩。香芎散、桃紅散主之。

香芎散

芎藭　獨活　旋覆花　葉本（去苗）　細辛（去苗）

蔓荊子（各一兩）　石膏（研）　甘草（炙）　荊芥穗（各半兩）

右爲末。每服五錢。水一盞。薑三片。同煎至七分。去滓。溫服。不拘時。

桃紅散

白附子（新羅者）　黃丹（等分）

右同炒。候黃丹深紫色。篩出黃丹不用。只將白附子爲末。清茶調下一錢匕。

若頭眩發則欲嘔。心下溫溫。胸中如滿。由胸上停痰。胃氣不流。盤鬱不散。氣上騰入腦。腦滿則眩。關脈沉弦。或謂之痰眩。旋覆花丸主之。

旋覆花丸（見前熱證門）

若但暈而不眩。發則伏地昏昏。食頃乃蘇。由榮衛錯亂。氣血涸濁。陽氣逆行。（指南云。此由邪客諸氣。陰陽持脈。上者不得下。下者不得上。上下相隔。精神散亂。）上下相隔。氣復通則蘇。脈虛大而澀。謂之氣暈。流氣飲子、草烏頭湯主之。

流氣飲子

紫蘇葉　青皮　當歸洗　芍藥　烏藥

茯苓　桔梗　半夏湯洗七遍焙乾爲末薑汁和陰乾　黃耆　木香一分

枳實麩炒去瓤　防風各半兩　甘草炙　橘皮洗各三分

連皮大腹剉薑汁浸一宿焙一兩　川芎三分

右爲散每服五錢水二盞生薑三片棗一個同煎至一盞去滓温服

草烏頭湯

草烏頭去皮尖生用　細辛去苗　茶芽等分

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓緩緩服盡

若但欲上視目瞑不能開開而眩唾出若涕惡風振寒由腎氣不足動作勞損風搏於肺腎氣不足膀胱不榮於外故使強上瞑視因其勞而受風在肺故唾出若涕而惡風謂之勞風芍藥黃耆湯主之

芍藥黃耆湯

芍藥二兩　黃耆三兩　川芎二兩　烏頭炮去皮半兩

右爲散每服五錢水二盞薑三片棗一個同煎至一盞去滓温服

厥證

論曰。若暴厥。卒然不知人事。身脈皆動。其狀如尸。聽其耳中如循嚢聲。股間暖。由邪氣折於手足少陰太陰足陽明之絡。五絡俱竭。腎氣微少。精血奔氣促迫。上入胸膈。宗氣反聚。血結心下。陽氣下墮。陰氣卒上而不交。陰陽離居。身温而汗出。氣復反。則唇青身冷。此爲入藏。即死。謂之尸厥。先以竹管吹左耳極三度。又吹右耳如前。灸熨斗熨兩脇。以石菖蒲末著舌下。及吹鼻中。又刺足大指內側。爪甲去端如韭葉。入一分。留三呼。謂隱白穴也。出之。又刺足心湧泉穴。如上法。又刺足中指爪上。令破。如上法。謂厲兌穴也。又刺手大指內側。去端如韭葉。又刺手心主。謂中衝穴也。又刺掌後銳骨之端。謂神門穴也。又剔取頭左角之髮。燒灰。酒服方寸匕。不能飲。灌之。後太乙神精丹。

太乙神精丹方缺。

若居常無苦。忽然如死。身不動。默默不知人。目閉不能開。口噤不能語。又或似有知。而惡聞人聲。或但如眩冒。移時乃寤。此由亡汗過多。血少氣併。血中氣血爭。陰陽亂。氣過血還。則陰陽復通。而人乃寤。謂之鬱冒。血厥。此證多生婦人男子亦有之。白薇湯、倉公散主之。

白薇湯

白薇一兩　當歸一兩　人參半兩

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓温服。

倉公散

瓜蒂　藜蘆　雄黃研　礬石火煅一伏時研

右等分爲末以豆許吹鼻內醒爲度

若卒然昏冒無所知或妄言語此由暴驚心無所倚神無所歸久不治陰陽相併或陰氣併陽陽氣併陰令人九竅閉塞狀類尸厥菖蒲散主之

菖蒲散

石菖蒲一兩　麝香研一錢

右爲細末酒調服二錢或飲亦得

若忽然瘈瘲瞑目不能語喉中有聲大便不通胸滿欲嘔或惡人聲聞人聲則惕然而驚或時叫此得之暴驚氣積而不散伏痰聚於中脘濕漬於脾久而脾氣既耗水氣乘之則風動四末宜先吐之以勝金丸次宜玉壺丸以大便利卽止有熱則脈洪數此脾鬱於心鐵粉丸主之

勝金丸方缺

玉壺丸方缺

鐵粉丸

鐵粉二兩　硃砂研一兩　牛黃研　天竺黃研　鉛霜研各半兩

天南星

右爲末。薑汁煮糊爲丸如梧桐子大。生薑湯下五九。

若素無疾。而暴得痰癎。發訖卽如常。經隔月日又復如前。由陰陽失其常度。氣血相併也。此謂之癇。宜龍齒丸。烏鴉散。獨活湯主之。

龍齒丸

牛黃研 麝香半錢研各 羚羊角鎉 龍齒 龍骨

羊齒火煅赤各一分 硃砂研半兩 蛇退炒 白僵蠶炒各一分

右爲末。煉蜜和丸如梧桐子大。飲下五九。臨臥服。

烏鴉散

臘月烏鴉一個去足嘴大翅。用麝香一錢。填口內。以好紙通裹了。再用鹽紙和泥團了。候乾。炭火燒烟盡取出爲末。更入麝香一錢研和。飲調方寸匕。日二服。

獨活湯

獨活一兩 細辛去苗一分 僵蠶炒半兩 牡丹皮三分 防巳半兩

紫菀去苗一分

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓溫服。

若病人喜怒不常。獨閉戶牖而處。惡聞人聲者。蓋陽氣常動。因暴折而難決。肝膽氣鬱而不伸。故令喜怒。

謂之陽厥宜鐵落飲無食肉及菖蒲散

鐵落飲方缺

菖蒲散見前

若言語不避親疎或棄衣而走登高而歌此思慮用心太過神散不藏又或悲哭忽忽不樂神有餘則笑爲狂勝金丸主之神不足則悲露朱丹主之

勝金丸方缺

露朱丹

好硃砂一兩碎

右用眞琉璃器盛之露四十九夜陰雨不算數研細入牛黃半錢研和滴熟蜜珠子丸如梧桐子大空心人參湯下一粒

若腫首頭重足不能行發則眴仆此太陽厥也烏頭湯主之

烏頭湯見前眩暈門

若喜怒噎痛不肉食氣奔走上刺足下中央之脈血出而止

痰飲

論曰若咽中如炙肉臠嚥之不下吐之不出由胃寒乘肺肺胃寒則津液聚而成痰致肺管不利氣與痰

相搏。其脈澀。半夏厚朴湯主之。

半夏厚朴湯

半夏（湯洗七遍）五兩。　厚朴（去皮。薑汁塗炙。）三兩。　茯苓　紫蘇葉　各二兩。

右爲散。每服五錢。水二盞。生薑十片。同煎至一盞。去滓。食前温服。

若心下盤旋。欲吐不吐。由飲癖停留不散。枳朮湯主之。

枳朮湯

白朮（四兩）　枳實（麩炒。去瓤）二兩。

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。食前温服。

若腹滿。按之沒指。隨手而起。餘與正水皆同。但四肢聶聶動。其脈亦浮。由肺氣久虛。爲風邪所客。氣不得運。百脈閉塞。氣結陰聚。成水。謂之皮水。亦宜發汗。先以防已湯。次以大豆散。

防已湯

防已（三兩）　人參（四兩）　桂心（二兩）　茯苓（四兩）

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓温服。

大豆散方缺。

若欬嗽。喘不得臥。面浮腫。脈弦急或遲。由肺胃停寒。水聚成飲。支乘於心。氣不得下。謂之支飲。宜先用十

棗湯瀉之。後宜防巳湯主之。

十棗湯

芫花（炒黑）　甘遂　大戟（各等分）　大棗（十枚）

右先煮棗。去滓。內前藥末。強人服一錢。虛人服五分。若病不除。再服。得快下爲度。後以糜粥自養。防巳湯（見前）

消證

論曰。消渴之病。其來有二。或少服五石湯丸。恣慾不節。不待年高。氣血衰耗。石性獨存。火烈焦槁。精血涸竭。其狀渴而肌肉消。又有積久飲酒。酒性酷熱。薰蒸五藏。津液枯燥而血澀。其狀渴而肉不消。如解五石毒者。宜罌粟湯。欲止渴者。宜兔絲子丸。大渴而加煩熱者。宜馬通散、栝樓粉罌粟湯（見前痺證門）。

兔絲子丸

兔絲子（不計多少。揀淨。）水淘。酒浸三宿。

右控乾。乘潤搗羅爲散。焙乾。再爲細末。煉蜜和丸如梧桐子大。食前飲下五十粒。一日二三服。或作散飲。調下三錢。　瑣碎錄云。用酒浸。晒於日中三兩日。一換酒。用時洗去酒。濃煎湯飲。

馬通散方缺。

栝樓粉（方缺）

若其人素渴引水。一旦不飲不渴。小便日夜數十行。氣乏肉消脫。此消中腎氣敗也。茱萸丸主之。

茱萸丸

萸（洗切。酒浸。焙。）　五味子（炒）　山茱萸　乾山藥（等分）

右爲末。酒糊爲丸如梧桐子大。飲下三十粒。空心服。

疸病

論曰。黃疸之病。皆屬於脾。脾屬土而色黃。惡濕。濕勝則土氣不行而鬱。故發則眞色見。蓋黃疸本得之濕。瘀熱在裏。濕熱相搏。身必發黃。若先有留熱。而後爲濕氣所加。則熱多而濕少。治之先導其熱。若先爲濕氣所乘。而後有熱。則濕多而熱少。治之先去其濕。去其濕則熱從而去。亦有因冷痞結。陰加於陽。上下氣不通。而脾氣不行。則陰氣鬱而生濕。其狀胸中痞嘔逆。時惡寒。當先除痞。利其小便。則濕自去。脈洪大。大便利。加渴者死。脈微小。小便不利。不渴。則生。若病人一身悉黃。四肢微腫。胸滿不得臥。汗出如黃檗汁。此由大汗出。卒入水中所致。苦酒湯主之。

苦酒湯

黃耆（五兩）　芍藥　桂心（取心。各三兩。）

右爲散。每服五錢。水二盞半。苦酒半盞。同煎至一盞。去滓溫服。

若因他病未除。忽然一身面目悉黃如橘。瘀熱在裏也。或因大熱。以冷水洗之。濕熱相搏。薰蒸肌肉。謂之黃疸。藜皮湯主之。茵陳五苓散主之。

藜皮湯

黃藜　黃連　黃芩各等分

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓溫服。

茵陳五苓散

茵陳一兩　猪苓　茯苓　白朮炒各十八銖　澤瀉一兩半

桂心半兩

右爲散。每服五錢。水一盞半。煎至一盞。去滓溫服。

若心下懊痛。足膝脛滿。小便黃。面發赤斑。由大醉當風入水。濕加於熱。內蒸脾氣。謂之酒疸。治屬飲家。茯苓半夏湯主之。

茯苓半夏湯

茯苓四兩　半夏二盞半湯洗七遍　旋覆花三錢　甘遂剉末炒一錢

右咬咀。水二盞。煎至一盞。去滓。將甘遂末分二服。用藥汁半盞調服。以利爲度。

若脈浮。腹滿欲嘔吐者。先吐之。瓜蒂散主之。脈沉。腹滿。大便祕。先利之。大黃丸主之。

瓜蒂散

瓜蒂　赤小豆　秫米・等分

右爲細末・粥飲調方寸匕・以吐爲度・

大黃丸

大黃・煨　葶藶各等分・

右爲細末・煉蜜和丸如梧桐子大・蜜湯下十粒・以利爲度・

# 全生指迷方卷四

## 欬嗽

論曰古書有欬而無嗽後人以欬嗽兼言之者蓋其聲響毫不因痰涎而發謂之欬痰涎上下隨聲而發謂之嗽如水之漱蕩能漱其氣也諸欬之原其來雖各不同其氣必至於肺而後發若非其時感邪而發欬者固因藏氣虛弱抑或五行之氣內相剋制病作卽治無使傳注不卽治之傳注他藏遂至不起然有因寒者因風者因熱者風寒從外至熱則從內起風寒則諸經自受其邪熱則臟腑薰蒸乘而爲病風則散之寒則温之熱則調之瀉之因風者惡風出風中則欬甚因寒者遇寒則劇因熱者得熱則發若因外感風寒不卽治之邪氣留淫日深攻傷藏氣一藏受極遂傳其所不勝如肺經受病久而不去欬則右脇痛不可轉側遂傳之肝肝屬木肺屬金金剋木欬引左脇不可臥臥則欬劇遂傳之脾脾土也爲木來剋則大便鴨溏甚則痺瘓如瘫狀次傳之腎腎屬水爲土所剋則骨痿不能起於牀手足浮腫次傳之心則死若因藏氣自相薰蒸如心乘於肺急補肺而瀉心補肺宜辛甘瀉心宜苦若脾熱薰蒸但瀉其脾治以甘平調肺以辛温謂之間傳學宜知此

若肺欬惡風脈浮小青龍湯主之

惡寒脈緊杏子湯主之

微弱者。鍾乳丸主之。

惡熱喉燥。脈數甚則咯血。天門冬湯。杏子湯主之。孫氏仁存活法祕方。肺欬之狀。喘息有音。甚則咯血。小青龍湯（見傷寒證門）。

杏子湯

杏仁（去皮尖）名一　乾薑　細辛（去苗）　甘草（炙）各半兩　五味子　桂心名一兩

右爲散。每服五錢。水二盞。棗一箇。同煎至一盞。去滓。溫服。痰多者。加半夏半兩。湯洗七遍。

鍾乳丸

鍾乳（銀石器內。煮一伏時。研一伏時）一兩　紫菀（去苗及枯燥者）半兩　桑白皮（一分。剉微炒）　款冬花（去苗及枯燥者）各半兩

右爲細末。煉蜜和丸如梧桐子大。飲下三十丸。食前服。

天門冬湯

天門冬（去心）各半　紫菀（去苗及枯燥者。焙）　知母（焙）各一兩　桑白皮　五味子　桔梗兩。

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。溫服。欬血者。加蒲黃半兩。炒燥。大便澀而喘。加葶藶半兩。

若心痰脈浮惡風桂心湯主之。

惡寒時口噤脈緊大附子細辛湯主之。

惡熱脈疾小便赤澀茯苓湯主之。

桂心湯　孫氏仁存活法祕方云心痰之狀上引心痛喉介介然如梗甚則咽喉腫痛脈浮惡風宜桂心湯。

人參　桂（去心）　白茯苓（各一兩）　麻黃　貝母（炒）（各半兩）

遠志（去心）　甘草（炙）（各一分）

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服。

附子細辛湯

附子（炮去皮臍）　細辛（去苗）（各半兩）　人參　蒼蒲（各一兩）

五味子（二兩）　甘草（炙）（半兩）

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服。

茯苓湯

茯苓（去皮尖）　麥門冬（去心）　黃芩（各一兩）　秦艽（去土）　柴胡（去苗）（各半兩）

杏仁（去皮尖）（一分）

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓温服。

若肝欬。惡風。脈浮弦。射干湯主之。孫氏仁存活法祕方云。肝欬之狀。欬則兩脇痛甚。則不可轉側。轉側兩脇下滿。

惡寒。脈弦緊。五味子煎主之。

惡痛。脈疾。目赤。頭眩。百部丸主之。

射干湯

射干　麻黄去根節。各半兩。　五味子　半夏湯泡七遍。各一兩。　款冬花二兩。

右爲散。每服五錢。水二盞。薑五片。同煎至一盞。去滓。温服。

五味子煎

五味子五兩　桂取心。一兩。　川烏頭炮。去皮臍。一兩。

右爲末。水五升。煎至一升。絞取汗。用好蜜二兩。再熬成膏。温酒化彈子大。食前服。

百部丸

百部八兩。爲細末。　生地黄五斤。取汁。熬成膏。

右將地黄膏和百部。爲丸如梧桐子大。飲下三十粒。食後服。

若脾欬。惡風。脈浮緩。麻黄厚朴湯主之。孫氏仁存活法祕方云。脾欬之狀。欬則右脇下痛。引肩背痛甚

則不可以動動則厥劇
口中如含霜雪中脘隱隱冷惡寒脈緊弱溫中丸主之
大便堅從腹上至頭發熱脈疾伏苓丸主之
麻黃厚朴湯
厚朴去皮薑汁炙麻黃去根杏仁去皮尖各
甘草炙半夏湯洗七遍各半兩橘皮洗各一兩
右爲散每服五錢水二盞薑五片同煎至一盞去滓溫服
溫中丸
乾薑半夏湯洗七遍各一兩白朮二兩細辛去苗
右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大米飲下三十粒食前服
茯苓丸
茯苓各一兩黃芩五味子半兩
橘皮洗一兩桔梗半兩半夏湯洗七遍切薑汁浸焙三分胡椒各半兩
右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大米飲下三十粒食後服
若腎厥惡風脈浮白前湯主之孫氏仁存活法祕方云腎厥之狀則腰背相引疼痛

惡寒。唾冷沫。小便數。脈緊。椒紅丸主之。
惡熱。骨間煩疼。地骨皮湯主之。

白前湯

白前　細辛（去苗）　川芎　五味子（各一兩）
芍藥　桂（取心）（各半兩）　麻黃（去根節）

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓溫服。

椒紅丸

椒（去目。炒出汗。半兩）　款冬花　紫菀（去苗及枯燥者）　乾薑（各一兩）
附子（炮。去皮臍）　細辛（去苗）　皁莢（去子。酥炙）　礬石（火煅一伏時）（各半兩）

右爲細末。煉蜜和丸如梧桐子大。米飲下三十粒。食前服。

地骨皮湯

地骨皮　百部（各二兩）　芍藥　赤茯苓（各一兩）

右爲散。每服五錢。水二盞。竹葉十片。同煎至一盞。去滓。食後溫服。

若顴骨赤大如錢。日晡發熱者死。若潮熱有時。五心煩熱。搏於榮衞。不效者易治。脈促濇者難治。靑蒿煎、柴胡芍藥湯主之。

青蒿煎

青蒿汁一升　人參　麥門冬去心各一兩

右將二味爲末用青蒿汁同熬成膏丸如梧桐子大飲下二十粒食後服

柴胡芍藥湯

柴胡去苗　芍藥各一兩　地骨皮　石膏各半兩

右爲散每服五錢水二盞小麥五十粒同煎至一盞去滓食後温服

若但嗜臥飲食不榮肌膚或不能食心腹虛脹滑泄背膂牽急勞倦不能動止或因大病後或因下利後不復常得之於脾脈弦大甚者不治四肢煩厥亦謂之肉極炙肝散白朮丸主之

炙肝散見前氣證門

白朮丸

白朮　橘皮洗各一兩　厚朴去皮薑汁塗炙焦　人參各半兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大米飲下三十丸

若欬嗽如膿涕或微喘急短氣脇下痛皮膚乾燥動則欬極由形寒飲冷傷於肺經久嗽不已則肺枯燥令人先寒後熱脈弱者可治或緊或弦者不可治

喘證

論曰凡人一呼一吸謂之息呼出心肺吸入腎肝呼吸之間脾受其氣曰榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度而周身之氣無過不及若藏氣乘併則榮衛不能循常氣過周身失度不能隨陰陽出入以成息故促迫而喘諸氣併上於肺肺管隘則氣爭而喘也其始或因墜墮恐懼恐則精却精却則上焦閉而氣不行氣不行則留於肝肝乘於肺此喘出於肝也或因驚恐驚心心無所倚神無所歸氣亂而氣乘於肺此喘出于心也或因渡水跌仆腎氣暴傷腎氣乘肺此喘出於腎也或因飽食過傷動作用力穀氣不流行脾氣逆而乘肺此喘出於脾也團參散主之

若喘而發熱頸脈皆動日漸瘦削由客熱乘肺或因飲食失宜氣不轉而氣急悞服熱藥火氣薰肺而遂喘頰赤咽燥其脈細數治屬骨蒸小建中湯天門冬湯主之

團參散

人參一兩　桑白皮剉炒二兩　大腹皮剉炒一兩　麥門冬去心一兩　橘皮洗一兩
吳茱萸炒　檳榔剉炒　芫花炒　附子炮去皮臍　澤瀉各半兩
半夏麴一兩　訶子炮去核半兩　杏仁去皮尖研　桂心各一兩　枳實麩炒去瓤半兩
白朮半兩

右爲細末薑汁煮糊爲丸如梧桐子大米飲下三十粒食前服

小建中湯

芍藥 六兩　桂心 三兩　甘草 炙 二兩

右爲散每服五錢水二盞生薑三片棗二箇同煎至一盞去滓温服

天門冬湯

天門冬 去心 一兩　馬兜鈴 百部 各半兩

右爲散每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服

若喘嗽時血出四肢懈怠脈浮大而沉由腎氣上併於胃氣道壅塞血無所行而散溢於脾精不化上不勝下脾之絡脈外絕去胃外歸陽明白朮丸主之

白朮丸

麥門冬 去心　人參　茯苓　白朮　澤瀉　生地黃 焙　大豆卷 各一兩　桑白皮 炒 二兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大米飲下三十粒食前服

若病人不臥臥而有所不安則喘者藏有所傷精有所寄故不得臥而喘肺氣盛脈滿大也牡蠣散主之

牡蠣散

用左顧牡蠣文片色白正者二兩先炸爲粗末以乾鍋子盛火燒通赤放冷研爲細末每服一錢濃煎鯽魚湯調下不拘時鯽魚重四兩者一箇去鱗肚濃煎煎時不許動

若欬嗽逆倚息喘急鼻張其人不得仰咽中作水雞聲時發時止由驚憂之氣畜而不散肺氣鬱或因過飽勞傷氣上行而不能出於肺復遇寒邪肺寒則諸氣收聚氣緩則息有所觸則發經久則不能治杏子散主之及灸腎腧百壯

杏子散

杏仁（去皮尖・鉄炒黄色・研成膏・）　麻黄（爲末・等分・）

右研和煎橘皮湯調二錢匕

玉腋散

人參　川芎　茯苓　桂心（各一兩・）　馬兜鈴（半兩）

知母　貝母（炒・）　杏仁（去皮尖・）　葶藶（炒・）　半夏（麯・各一兩・）

柴胡（去淨苗・一兩・）　石膏（炒・研・）　訶子（二兩・炮・各）　橘皮（洗・一兩半・）　麻黄（去根節・一兩・）

白朮（半・）　甘草（炙・）　羌活（各半兩・）

右爲細末每服三錢水一盞半生薑三片棗一箇煎至一盞去滓食前温服

若喘息肺鳴而痿蹶由有所失亡所求不得氣鬱而肺熱葉焦上舉是謂肺痿阿膠丸主之

阿膠丸

天門冬（去心・）　桔梗　生乾地黄（焙・）　阿膠（剉・炒・燥・）　桑白皮（剉・炒・）

麥冬（去心）　栝子仁（炒研，各半兩）　甘草（炙，一分）

右爲末，煉蜜和丸如彈子大，每服一丸，水一盞，煎至七分，食後温服。

嘔吐

論曰：嘔吐者，由清濁不分，中焦氣痞，若心下牢大如杯，或時寒時熱，朝食則暮吐，暮食則朝吐，關脈弦緊，弦則爲虚，緊則爲寒，虚寒相搏，此名爲格，與關格同也，是謂反胃，青金丹、朴附丸主之。

青金丹

硫黄　水銀　木香（末）

右將硫黄水銀二味同研，令不見水銀星子爲度，合木香再研，用生薑汁煮糊爲丸如梧桐子大，米飲下三粒，食後服。

朴附丸

厚朴（去皮，剉作小塊子）　附子（炮去皮臍，剉作塊子，各一兩）　生薑（八兩，去皮取汁）

右將二味以薑汁同煮，盡汁爲度，焙乾爲末，酒煮和丸如梧桐子大，米飲下三粒，食前服。若心中温温常欲嘔，聞食吐酸，由宿寒在胃，不能運水穀，中脘成痰，其關弦脈小而短，白朮丸、大半夏湯主之。

白朮丸　史氏指南方，無橘皮。

白朮三兩　半夏湯洗七遍二兩　橘皮洗　乾薑各三兩　丁香一兩

右爲細末薑汁煮糊爲丸如梧桐子大薑湯下三十丸食前服

大半夏湯

半夏一升　人參一兩　白蜜

右爲末每服三錢水一盞煎至半盞加白蜜少許食前服

若心上汪洋嘈煩頭目時痛胃中不利或嘔膽汁大便或利或祕喜渴此中脘伏痰旋覆丸主之

旋覆花丸見前熱證門

若心下虛滿不入飲食時時欲嘔嘔無所出憒憒短氣由他病差後復爲寒邪傷氣氣寒則不能食胃無穀氣以養其脈微弱大藿香散主之

大藿香散

藿香葉　人參各半　茯苓湯洗七遍爲末半兩　桔梗取心　木香

桂　白朮兩　半夏薑汁和丸餅子陰乾　枇杷葉十片刷去毛

右爲末每服三大錢水一盞炒薑絲一分與藥同煎至七分去滓食前温服　劉孟容瑣碎錄名藿香湯

若心下煩不喜熱物得熱卽嘔喜渴由胃受邪熱胃熱則氣濁陰陽渾亂其脈虛數或細而疾竹茹湯主

之.

竹茹湯

竹茹　橘皮　甘草　半夏　赤茯苓
麥冬　人參　枇杷葉

右加薑棗煎.胃寒.去竹茹麥冬.加丁香.實火.去人參.

若心下悶亂.嘔吐不止.臥起不安.手足躁擾.水漿不下.由冷熱不和.邪正相干.清濁不分.陰陽錯亂.喜冷者.因熱.惡冷者因寒.名曰霍亂.其脈弦大者寒也.大理中湯、半硫丸主之.其脈數疾者熱也.小藿香散、青金散主之.

大理中湯方缺.

半硫丸

半夏湯洗七遍.焙爲末.　硫黃

右研細.生薑汁煮.糊爲丸.米飲下三十丸.

小藿香散

丁香　枇杷葉.去毛　乾葛　赤茯苓　藿香葉
甘草

右爲末。每服三錢。水一盞。生薑三片。同煎至一盞。去滓。温服。

青金散方缺。

若卒然嘔吐。胷中痞悶。氣不下行。由飲食過傷。胷氣滯而不轉。胃中爲濁逆行。則吐。其脈沉疾。金汁丸主之。

金汁丸方缺。

若痛而嘔者。此寒氣客于腸胃。腸胃得寒。則聚沫。聚沫則痛。痛則氣逆。逆則津液反出而嘔。其脈緊細而滑。粳米湯主之。

粳米湯　陳粳米半。二兩

附子炮去皮臍。切片子。半兩。　半夏湯浸七遍。切片子。二兩半。　甘草炙。剉碎。一兩。

右拌和。分作十二服。每服用水三盞。薑十片。同煎至一盞。去滓温服。

若因嘔而噦者。吳茱萸丸主之。

吳茱萸丸

吳茱萸炒。一兩。　橘皮洗。二兩。　附子炮去皮臍。半兩。

右爲細末。白麵糊爲丸如梧桐子大。飲下二十粒。食前服。小便附大便。

論曰小腸爲受盛之府傳導水液若始覺小便微澁赤黃漸漸不通小腹膨脖由心經蘊熱傳於小腸小腸熱則滲於脬中脬辟而系轉診心脈大而牢用翡葉散或石葦湯主之

翡葉散

裹茶翡葉一兩燒灰　滑石半兩研

右爲細末沸湯浸服或小便暴不通點好茶一盃入生油三兩點飲之

石葦湯

石葦去毛剉　車前子剉車前葉亦可等分

右濃煮汁飲之若腹脹溺溲不得好臥屈膝陰縮腫此厥陰之厥加赤茯苓黃芩八兩如前若卒暴小便不通臍腹膨急氣上衝心悶絕欲死由忍尿勞役或從驚恐氣無所伸乘併膀胱氣衝脬系不正診其脈右手急大葱白湯主之

葱白湯

橘皮洗切三兩　葵子一兩　葱白三莖切

右以水五升煮取二升分三服

固脬丸

茴香炒一兩　桑螵蛸炒半兩　菟絲子揀淨酒浸一宿乘潤搗爛焙乾二兩　戎鹽炒一分

附子　炮去皮臍半兩。

右爲細末。煮糊爲丸如梧桐子大。飲下三十粒。空心服。

若小便純血。血下則凝。亦無痛處。悒悒短氣。由陽氣不固。陰無所守。五液注下。其脈散濇。欲絕而身冷者死。蒞莘丸主之。

蒞莘丸　史載之指南方。治虛勞溺血。加桑螵蛸半兩。炙焦。酒糊爲丸。鹽湯下。

菟絲子　揀淨。酒浸一宿。乘潤搗爛。再焙。　肉蒞莘　洗。切。焙。　鹿茸　去毛。截片。酥炙。　乾地黃　等分

右爲細末。煮糊爲丸。如梧桐子大。米飲下三十粒。空心服。

若大腸爲傳導之官。變化出焉。如大便不通者。津液燥也。愼無以烈藥。宜紫蘇丸主之。

紫蘇丸

紫蘇子　去皮。研。　橘皮　洗。各二兩。　知母　一兩

右爲末。用生薑汁調成稀膏。於重湯上煮。不住手攪。候可丸如梧桐子大。蜜湯下三十丸。

## 婦人科

四物加桂湯　治忽然寒熱。

川芎　當歸　洗。焙　芍藥　地黃　焙　桂心　等分

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。溫服。

史載之指南方內無川芎。

葶藶丸　治先因小便不利，後身面浮腫，致經血不行，此水乘於血，名曰水分。

甜葶藶（炒）　續隨子（去皮，研，各半兩）　乾笋（一兩）

右爲細末，熟棗肉和丸如梧桐子大，煎扁竹湯下七粒，如大便利者，減葶藶、續隨子各一分，加白朮半兩，食後服。

牡丹丸　治經候時行時止，或淋漓不斷，腹中時痛，其脈沉澀，由寒熱邪氣客於胞中，留而爲血滯，當有所去乃愈。

大黃（蒸）　附子（炮，去皮臍）　茯苓　牡蒙　牡丹皮

桔梗（各二兩）　菖蒲（去目，炒，出汗，半兩）　人參（去頭足翅）　厚朴（去皮，薑汁塗炙）　當歸（焙，各半兩）

甜葶藶（二兩，炒，各）　椒（去心，各半兩）　蜈蚣（五十箇）　吳茱萸（炒）　柴胡（去苗）

乾薑　桂（去心，各半兩）　細辛（去苗，兩半）

右爲細末，煉蜜和丸如梧桐子大，酒下十粒，未知，加至二十粒，食後服。

小薊湯　治經候過多，遂至崩漏，色鮮明如水下，得温則煩，至于昏悶，其脈數疾微小爲順，大者逆，由陰虛陽搏，爲熱所乘，傷于衝任，血得熱則流散，衝任不能收也。

小薊莖葉（洗，切，研，服）　生地黃汁（一盞）　白朮（半兩，細剉）

右以水一盞，同煎取一半，去滓，分二服。

人參白朮散　治婦人經候不來。身如病而無病。脈滑大而六位俱勻。謂之陰搏陽。有子也。精神如故。惡聞食臭。但嗜一物。或大吐時吐清水。此名惡阻。愼毋作他病治之。

白朮一兩　人參半兩　甘草炙一分　丁香各一分

右爲末。每服三錢。水一盞。生薑三片。同煎至七分。去滓。食前温服。

秦艽散　治胎動不安。

秦艽　阿膠炒　艾葉等分

右爲散。每服五錢。水二盞。糯米百粒。同煎至一盞。去滓温服。

白朮散　治妊娠面目腫如水狀。

橘皮洗　大腹皮　茯苓　生薑各半兩　白朮一兩

右爲末。飲調方寸匕。食前服。

兔血散　治難產。最要臨產服之。

臘兔血

右用蒸餅切片子。蘸血陰乾爲末。煎乳香湯調服二錢。

半夏散　治胎死腹中。其母面赤舌青者是。

半夏薑汁浸三日。炒乾。

右爲末。温酒調下一錢。不能酒。用湯。亦治横生逆産。

桃仁湯　治惡路頓絶。或漸少。腰重痛。下注兩股刺痛如錐刀刺。此留血於經絡。不卽通之。大有痛處。必作癰腫。

蘇木　地黄　桃仁（去皮尖・炒・各半兩）　蝱蟲（去頭足翅・炒・各三兩）　水蛭（炒・各三十枚）

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓温服。惡路行卽住服。

五香湯　治同前。

木香　丁香　沉香　乳香　麝香

升麻　獨活　連翹　木通（各三兩）　大黄（一兩）

桑寄

右爲散。每服五錢。水二盞。煎至一盞。去滓。食後温服。

沒藥丸　治惡路方行。忽然斷絶。驟作寒熱。臍腹大痛。胸中如以針刺。此大有畜血留於經絡。

當歸（焙・一兩）　桂心（各三兩）　芍藥（各半兩）　沒藥（一分）　桃仁（去皮尖・炒・一分）

蝱蟲（去頭足翅・炒・各三十枚）　水蛭（炒・各三十枚）

右爲細末。醋糊丸如梧桐子大。醋湯下三丸。

皁角散　治乳婦吹奶。由哺兒時鼻氣沖乳中。忽然腫硬痛。急手揉。服皁角散、枯樓散。及敷藥。不卽治之。

結癰膿能殺人。

皁角燒細研。　蛤粉研等分。

右研細熱酒調一匙或半錢急以手揉之取軟爲度。

瓜子湯　治腸頭如以針刺連穀道又因痔痛小便如淋狀時寒時熱此由產時用力氣併腸間亦由陰虛邪熱乘客留聚腸間熱結恐成腸癰　袁當時大方云崔左丞屢用有效

薏苡仁炒四兩　桃仁去皮尖　牡丹皮各三兩　瓜子一兩

右爲末每服五錢水二盞煎至一盞去滓温服。

# 洪氏集驗方

洪遵輯

本館據士禮居叢書本排印初編各叢書僅有此本

# 重刊宋本洪氏集驗方序

此集驗方五卷。南宋洪文安所手輯。文安名遵字景嚴。皓之仲子。以博學鴻詞中選。起家爲祕書省正字。孝宗朝。官至資政殿學士。方遵登制科時。高宗因皓遠使。推恩卽命遵入館。詞科中選卽入館。蓋自遵始。非故事也。宋祖宗之朝。君相以愛民爲務。官設惠濟局。以醫藥施舍貧人。故士大夫亦多留心方書。如世所傳蘇沈良方。許學士本事方之類。蓋一時風尙使然。夫古人立方各有深義。今世庸醫不知其理。妄行增損。遂有學醫人費之誚。憶孫淵如先生有言。今世外科每奏奇功。而內科不能者。外科用古方。而內科不用古方之故也。余往日刻新安程氏易簡方論一書。亦欲世人稍知古方本義。今復翁此書之刻。殆與余有同心也夫。吳縣石韞玉序。

# 重刊宋本洪氏集驗方後敍

洪氏集驗方惟延令季氏書目有之知宋板外絕無流傳之本余故從宋本錄副今始付雕其書五卷皆全無序有目而目共五葉其一號二號四號係舊時鈔補茲以烏絲欄細者別之此用汲古鈔補宋板例也本書字句間有不同如黃牛角鰓或有作腮者或云一枝或云一箇又慢火或作熳火又黃耆狀如箭幹長二三尺頭不叉者又疑叉之誤又洗淨寸截搥破□壁以鹽湯潤透□係蠹蝕處尙有系旁可審疑□是縣字以意補之其餘版心刻工姓名有蠹蝕去者空之無足重輕不復補寫以上各條皆隨舉一二以見宋刻原本如是非涉重刊而有訛舛脫漏也大抵方書之字大有關係處在藥名分兩法製諸端其餘異同可勿深論此書刊成求序於獨學老人有札示余云昨所言交感丹愚疑用香附太偏重因查檢處所藏方書乃是香附一個配茯神四兩尊鈔是香附一斤竊意香附一個無一斤重之理恐係抄胥之誤祈再查原本此固愼重起見然余卽以此方降氣湯牙藥二條證之一用半斤一用五兩是遞減用之原方一斤非誤俟宋之癖如是如是幷附著之以質諸深於醫理者一正其是非云嘉慶己卯孟秋吳縣黃丕烈敍

# 洪氏集驗方目錄

治痢茱連丸
大交感丹
瓊玉膏
鐵甕交感丹
化毒排膿內補散
靈寶膏
又發背灸法
治甲疽努肉
又勝冰散
治癰疽立効方
五解散
治腸風下血
肉豆蔻散
混元胎丹
一粒金丹
降氣湯
癰疽靈方
治癰疽發背方
治背疽糝藥
治癰疽經驗方
又應補內托圓
蔥蓉茸附圓
治痢育腸圓
比金散
祛瘧散
還少丹
神妙六逸丸
牙藥
治諸般瘡毒
發背灸法
內消發背
治癰疽奪命膏
又聖柳散
鹿茸世寶圓
硫附鹽礬圓
治腸風痔疾

阿魏良薑圓
水陸二仙丹
虛風圓
丁香草菓散
灸結胸傷寒
良薑湯
治胎衣不下
普救散
治舌衄
蔻蓉圓
治沙石淋
祕精圓
治痔烏金散
治腰痛
麋茸圓
神應乳香圓
四斤圓
神仙透空圓
治風烏荊圓
治氣塊刺痛
安腎圓
治喉口熱毒
治舌腫
治乾癬
治毒虵傷
治傷折骨碎
治傷風倍芩圓
治虛勞秋石丹
人參大温中圓
神妙驅風散
妙應圓
沈香蓽澄茄湯
烏金散
常服散子
治傷折神授散
肉豆蔻湯
治湯火傷
治淋
治冷積降氣
治疝氣偏墜
治風毒氣眼
治諸瘺

治豆瘡倒撮
治腸風
接骨方
癬藥
治傷風
灸勞法
治腰痛附牛圓
治癬疥
治鼻衄
治暑龍鬚散
治風牙蛀牙疼
治牙搖牙宣
治冷漏
治凍死
治喉閉二方
瘡藥方
治漏瘡
治喉閉
治脚腫
治頭風頭痛
治爛緣風眼
治脚氣灸法
治諸鯁
治風牙疼
治五種牙疼
治暴喘不止
治喉閉
治暍死
治腰痛
治癬
治外風入瘡口
治盜汗
治脚腫甘豆湯
茶牙湯治偏正頭疼
治髓瘡
治蛇毒
治盜汗
治蛀牙疼
治風蛀牙破者
治惡瘡久不較
治咽喉腫痛
治溺死

治火燒湯潑
治小腸氣
萬靈圓
治妊娠下血腰痛
治滑胎易產
產後大便不通
治小兒泄瀉
肥兒圓
助胃膏
羌活膏
沒石子圓
誤吞釘筒等物
誤食穀芒
治瘡瘍金華散
治湯火瘡
治產後百病
烏金散
治產後顛狂
產後羊肉湯
順經散
金液丹
神麴豆蔻圓
治麻豆瘡膿水
大天南星圓
誤吞珠銅鐵方
封顖
治口瘡消風散
治頭瘡如聖散
治嵌甲
催生如聖散
救生散
催生藥
產後防暈方
九寶飲
青州白丸子
木香分氣圓
辰砂安驚圓
治臍風撮口法
誤吞錢方
治吐
治腫雄朱散
治喉閉急風散

墜涎圓　辰砂圓　四君子圓
肥兒圓　觀音散

# 洪氏集驗方卷第一

治痢先忠宣獲此方屢有神驗。

黃連吳茱萸各二兩。如常法。揀洗焙乾。黃連剉令寸斷。同一處炒。俟香熟。分爲二。各用醋糊。爲丸如桐子大。若小兒則如棗豆大。悉赤痢。則服黃連。白痢。則服茱萸。赤白。則幷服之。赤先白後。則先黃連而後茱萸。赤多白少。則二分黃連二分茱萸。反是亦如之。每服五七十粒至百粒。服之以愈爲度。陳米飲下。大率茱萸治白。黃連治赤也。黃連用鷹爪者。

肉豆蔻散。治赤白痢。無藥可治者。其效如神。上吐下痢者亦治。已下三方。韓子溫少卿傳。

肉豆蔻切片子。炒黃色。
櫻粟殼搗碎。用蜜搭拌勻。炒黑黃。
甘草切碎。炒黃黑色。
乾生薑切細。炒黃黑。

右等分。搗羅爲末。每服六錢。如赤痢多。加甘草一寸。炙黃同煎。若白痢多。加炒生薑一塊。同煎。用水二大盞。煎至一盞半。通口服。不計時候。卻將兩服滓再煎服。無不愈者。

祛瘧散。熱多寒少者。一服無不驗。予家每合以濟人。一服卽愈。

治時行寒熱。諸藥不效者。今有夢中神傳藥方。如有此疾者。依方服之。卽愈。如所感深重。一服未愈者。

定毒發一次更不再來。

好高良薑剉碎。微炒。　好川白薑炮剉。

二味各碾爲極細末。

右各秤等分。勿令偏些。再入乳鉢內。一處研勻。細羅過二味。病大者共抄三大錢。病小者共三小錢。於當發日日未出時。以豬膽二枚。勿用白色者。割開取汁。與藥調勻。再用熱酒少許。打勻。通口猛作口嚥。更以酒少許送下。急嗽口。以甜物壓之。一日不得喫別藥。忌大寒物。其膽須是豬膽。其翁母豬膽不中。江南謂之鍬豬。

大交泰丹傷寒未分陰陽。不可服。

治陰陽二毒傷寒。或因下早亡陽。或致結伏胸膈。四肢厥冷。脈息俱無。心燥如火。或因冷物傷脾。夾臍痃痛生硬。入胃中滿痞塞。潮發寒熱。幷治醫胃噦逆。霍亂吐痢。小腸痃癖。脇肋氣痛。但是陰陽不順惡候。傷寒壞證。並皆治之。每服一粒。炭火內煆通赤。良久取出。放冷。細研如粉。米飲一盞。煎七分。温服。不拘時候。隔半時辰。再進一服。其效如神。兼治小兒瘡疹倒厭。依法服半粒。立愈。

金星石　大陰玄精石

銀星石　雲母石白色片子。

代赭石　桂府滑石

禹餘石已上各一兩。　寒水石吉州者一兩半。

不灰木一兩色青黑性軟者。

右件九味。入磁瓶子。炭半秤煅。候火耗一半。取出放冷。研爲細末。糯米粥爲圓如彈子大。候乾用。係醫證傷寒一服可活一人。

混元胎丹。乃陰陽始生之物。氣精血初生之英華。蓋人元宮眞氣所化。修眞之士服餌補漏。壯氣固神。益髓通神明。延壽命。增益道涯。超範圍外內丹之基。具服餌方如後。久無嗣息者服此有驗。

以首兒衣二八月者不用。收時連帶中元血收。

用長流水淨洗。控乾。入甕瓶中。下無灰法酒三大勝。腦子麝香隨力下之多少。一錢或半字。以紙封瓶口。下用文武火煅。候酒將盡。取出再入酒三勝。依前煅。卻用竹篦或金銀篦不住攪。以覺爛糜似粥模樣。待冷取入砂盆內細研如粉。別入外料。

人參二兩。　伏苓二兩。　乳香半兩。

朱砂半兩水飛過浪乾取淨。　山藥四兩。

已上並爲細末。人參等須擇佳者。

右用上件藥末。入於所煮藥內。如乾時。更用元煅酒。旋旋添。拌勻。一處攪搜爲元。梧桐子大。慢火焙乾。

每日空心五十粒。加至一百粒。用温酒鹽湯下。良久用甜淡飲食飽壓。逐日葷味中減少五味。（謂甜淡鹹等物。）服至五七日。微覺小腹連腰沈重。不須疑慮。乃是藥力攻元氣相補助如此。

西川羅赤脚仙還少丹。大補心腎脾胃一切虚損。神志俱耗。筋力頓衰。腰脚沈重。肢體倦怠。血氣羸乏。小便昏濁。（陳晦叔敷文傳。）

乾山藥
山茱萸
五味子
石菖蒲
遠志（去心。）
楮實
枸杞子

右搗羅爲末。煉蜜入棗肉爲圓如梧桐子大。每服三十圓。温酒鹽湯下。日進三服。皆食空時。（如早食併服之無妨。）至五日覺有力。十日精神爽健。半月氣力稍盛。二十日目明。一月夜思飲食。冬月手足常暖。久服無毒。令人身體輕健。筋骨壯盛。怡悦難老。更看體候加減。如身熱。加山梔子一兩。心氣不寧。加麥門冬一兩。

牛膝（酒浸一宿。焙乾。）各一兩半。
白茯苓（去皮。）
肉蓯蓉（酒浸一宿。焙乾。）
巴戟（去心。）
杜仲（去麁皮。用生薑汁并酒合和塗炙。令熟。）
舶上茴香（已上各一兩。）
熟乾地黄（各半兩。）

少精神。加五味子一兩。陽弱。加續斷一兩。常服。齒牢。永無瘴癘。婦人服之。姿容光悅。去一切病。治子宮久冷。

鐵瓮先生神仙祕法瓊玉膏 陳晦叔服此藥有驗。

新羅人參二十四兩。春一千下爲末。　生地黃一秤十六斤。九月採搗。

雪白伏苓四十九兩。木臼千下爲末。　白沙蜜十斤。

右件。人參伏苓爲細末。蜜用生絹濾過。地黃取自然汁。搗時不得用鐵器。取汁盡。去滓。用藥一處拌和勻。入銀石器或好甕器內封用。如器物小。分兩處物盛。用淨紙二三十重封閉。入湯內。以桑木柴火煮六日。如連夜火。卽三日夜。取出。用臘紙數重包瓶口。入井內去火毒。一伏時取出。再入舊湯內。煮一日。出水氣。取出開封。取三匙作三盞。祭天地百神。焚香設拜。至誠端心。每晨朝。以二匙溫酒化服。不飮者。白湯化之。此膏塡精補髓。腸化爲筋。萬神具足。五臟盈溢。髓實血滿。髮白變黑。返老還童。行如奔馬。日進數食。或終日不食。亦不飢。關通強記。日誦萬言。神識高邁。夜無夢想。人年二十七歲以前服此一料。可壽三百六十歲。四十五歲以前服者。可壽二百四十歲。六十三歲以前服者。可壽百廿歲。六十四歲以上服之。可壽至百歲。服之十劑。絕嗜慾。修陰功。成地仙矣。一料分五處。可救五人癰疾。分十處。可救十人勞瘵。修合之時。沐浴志誠。勿輕示人。

一粒金丹。治中風癱瘓。口眼喎斜。涎潮語澀。渾身疼痛。應一切風疾。悉皆治愈。張眞甫舍人傳得之劉信叔。

大川烏頭炮去皮臍。　大黑附子炮裂去皮臍。
新羅附子炮裂。已上各二兩。　五茶脂一兩。
白殭蠶一兩。去絲。炒。　白蒺藜一兩。炒。去刺。
沒藥半兩。研。　朱砂半兩。研。
白礬一兩。枯。研。　麝香淨肉半兩。研。
細香墨半兩。　金箔二百片。

右件前六味同爲末。後四味研勻。同合和令勻。用井花水一大盞研墨盡爲度。將汁搜和。用杵臼內搗五百下。和圓如彈子大。金箔爲衣。窖乾。每服一粒。用生薑一兩。去皮。擦取自然汁。將藥圓於汁內磨化盡。用無灰熱酒一大盞。同浸化。溫服。更量性多少。喫溫酒一二升。投之。以助藥力。用衣被蓋覆。汗出爲效。痛勢重者。日進二服。不拘時候。

張天師留傳老換少壯。輕身強記。駐顏悅色。髮白變黑。開心中迷忘。聰明耳目。神妙六逸圓方。賀州王承務若樸傳。

石菖蒲九節者。能開心孔。聰明耳目。益智不忘。出音聲。治耳聾。高志不老。

菟絲子補不足。益氣力。堅筋骨。主口苦燥渴。久服輕身延年。

地骨皮主五藏邪氣。燥熱消渴。神益眞氣。久服輕身堅筋骨。不老耐寒暑。

遠志補不足。除邪氣。益精神。注智。聰明耳目。去皮膚中熱。久服輕身不老。好顏色益心。

生乾地黃填骨髓。長肌肉。去胃中宿食。補五藏。通血脈。益氣力。利耳目。

牛膝能助人筋骨。偏治腰疼。益眞氣。變白髮。久服輕身不老。耐寒暑。

右件藥各用二兩。先搥剉碎。用酒浸之。春夏五日。秋冬七日。慢火焙乾。搗羅爲末。煉蜜爲圓如梧桐子大。每服空心溫酒下三十圓至五十圓。百病俱退。服至一百日。老卻少容。服至一年。髮如漆。過二年顏如童子。三年骨髓堅實。四年鬼神自散。精神爽清。合藥并服時。忌鷄犬見。所傳不得過十三家。湖州杜助教所傳。葛仙翁六神圓。用藥六味。與此方同。

鐵甕申先生交感丹俞居易侍郎傳。

世人中年精耗神衰。常言百事心灰。蓋緣心血少。而火不能下降於腎。氣憊而水不能上升至心。中焦隔絕。榮衞不和。所苦者上則心多驚悸。中則寒痞飲食減少。下則虛冷遺泄。甚至於陰痿不興。臟氣滑洩。愚醫徒知峻補下田。非獨不能生水滋心。而建僞失眞。立見衰悴。天折之由。當自此始。悲夫。所處此方。廣濟迷流。然不可忽。此藥品。志心服之半年。漸屏去一切暖藥。又不可恃此而馳嗜慾。然後力習祕固沂流之

術。其神效不可殫述。質之天地。切勿妄傳。居易之祖通奉遺訓云。予年五十一歲。遇鐵甕申先生。授此祕術。酷志行持。服食一年大補。半日所服暖藥。一切屏盡。而飲食嗜好不減壯歲。此藥力之功大矣。今年八十五。享天然之壽。瞑目無憾。獨此藥傳之。理當普示羣生。同登道果。藥後有湯與牙藥。可同用之。

伏神四兩。　香附子一斤。去毛。用新水浸一宿。炒令黃色。

右爲末。煉蜜圓如彈子大。每服。侵晨一圓。以後湯嚥下。

## 降氣湯

伏神二兩。　香附子半斤。炒浸如前。

甘草一兩半。炙黃。

右爲末。每服二錢。沸湯點下。

## 牙藥

香附子五兩。

右以生薑三兩研。和滓汁。浸香附子三夕。炒焦黑。存性。爲末。以青鹽二錢。拌勻。揩牙。

# 洪氏集驗方卷第二

化毒排膿內補散丞相兄刊是方於徽州予屢以施人皆効

治一切癰疽瘡癤未成者速散已成者速潰敗膿自出無用手擠惡肉自去不犯刀仗服藥後疼痛頓減此其嘗試之效也歙丞胡權初得方於都下異人時有苦背瘍者七十餘頭諸藥遍試不效因出是方示之衆醫環立相目而笑曰是豈癰疽所用藥耶固謂之曰古人處方自有意義觀其所用藥性平和縱未能已疾必不至壞病服之何害迺治藥與服以熱酒半升許下藥五六錢少頃痛減七分數服之後瘡大潰膿血流迸若有物自內托之服之經月瘡口遂合若未嘗有所苦者又有苦腹疾者其痛異常醫者莫曉時意此藥頗能止痛試以餌之當日下膿二三椀許痛亦隨止乃腸癰也又一老人忽胸間發腫根脚甚大毒氣上攻如一瓠然斜插項右不能轉動服藥明日毒腫既散餘一小瘤如栗許大又明日帖然如故又一人發腦疑此方不服既殞於庸醫之手明年其子復苦此與父之狀不異因憊父之失縱酒飲藥遂至大醉竟日裂臥地上酒醒病已去矣又一婦人發乳癰腫疼痛不可堪忍自謂無復生理又二婦人股間發腫大如杯椀服此皆脫然如失蒙濟者不可悉數姑敍大略以示未知此方者大抵癰疽之作皆氣血凝滯風毒壅結所致治之不早則外壞肌肉內攻藏府去生遠矣詳味

此方其所用者皆發散風毒流行氣血排膿止痛生肌長肉等藥五毒不試而坐收瘍醫十全之功其可尚已今校本草於逐味下聊疏藥性温涼與所治療雖處方妙指不可遽曉庶倉猝之際可以見其用藥大意而服之不疑

人參　微温無毒主補五藏除邪氣通血脉破堅積療心腹鼓痛胃脇逆滿今以新羅者爲上擇圓結重實滋潤者洗淨去蘆薄切焙乾

當歸　大温無毒主温中止痛除客血内塞客氣虚冷補五藏生肌肉治一切風一切勞破惡血養新血又外臺金櫃等方皆謂大補不足決取立効之藥凡氣血昏亂者服之即定謂能使氣血歸所當歸制名之義宜出於此今取川中來者擇大片如馬尾狀滋潤甜辣芬香者温水洗薄切焙乾

黄耆　微温無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛逐五藏間惡血補丈夫虚損五勞羸瘦煩悶熱毒活血以綿上好者爲勝狀如箭幹長二三尺頭不叉者洗淨寸截搥破縛壁以鹽湯泡透用蓋盛蓋湯瓶上一炊久焙燥蓋衆藥入碾細成細末

芎藭　温無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣拘急除腦中冷痛面上游風治一切風一切氣一切血一切勞損諸寒心腹堅痛中惡卒急腹痛腰脚軟弱半身不遂壯筋骨調衆脉破癥結治癰疽發背排膿消瘀養血長肉以川中來者爲上用撫芎大塊者淨洗切焙

防風　温無毒治心腹痛四肢拘急經脉虚羸主骨節風男子一切勞劣補中益神通利五藏關脉五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣脉擇新香者洗淨切焙

厚朴　大温無毒主中風寒熱血痺死肌温中下氣去留熱止煩滿宽腸胃去結水破宿血消化水穀止五藏一切氣痛宜用梓州來者肉厚而色紫捾之油出去麤皮切薑汁炙一宿爐熱焙燥切勿用杜朴

桔梗　微温有小毒主胃脇痛如刀刺喉咽滿腸鳴利五藏補血氣除寒熱破血消積止心腹脹痛補五勞養氣除邪又養血排膿補内漏療胃中寒肺脉數咽燥不渴時時出濁唾腥臭吐膿如粳米

粥是肺癰治之用桔梗甘草各二兩水三升煮取一升分再服朝暮吐膿血即差今所在有之以有心味苦者爲眞無心味甘者薺苨也主解藥毒恐於衆藥不利切勿誤用洗淨去頭尾溝切焙燥

白芷 瘡癤無毒破宿血長新血治乳癰腸風痔瘻排膿止痛生肌

桂 大熱有小毒一曰温無毒爲諸藥先聘主温中利肝肺氣去心腹寒熱補五勞七傷通九竅利關節破堅癖癥瘕消瘀血續筋骨生肌肉筒厚者宜入治藏及下部藥輕薄者宜入治頭目發散藥今宜用全薄者古法帶皮桂每兩止取二錢半合用一兩者當買四兩候衆藥罷別碾方入

甘草 平無毒主赦府寒熱邪氣堅筋骨長肌肉解毒温中下氣倍力生川

右十味選藥貴精皆取淨曬焙極燥方秤入參當歸黃耆各二兩餘各一兩除桂外一處爲細末入桂令勻每服自三錢加至五六錢熱酒調下日夜各數服以多爲妙服至瘡口合更服爲佳所以補前損杜後患也不飲酒人濃煎木香湯下然不若酒力之勝也或飲酒不多能勉強間用酒調幷以木香湯解酒功效當不減於酒也

神授癰疽靈方 唐呂西華遇胡僧授此方沈存中良方備載其事

白麥飯石 顏色黃白類麥飯者曾作磨者尤佳火燒赤醋中浸之十遍止爲末

白斂末 與石等分

鹿角 三二寸截之不用自脫者凡帶腦骨者即非自脫灰火燒之煙盡爲度搗爲末倍前二味

右並搗篩令細取多年米醋於鐺中煎並令魚眼沸即下前件末調如稀餳以篦子塗傅腫上只當瘡

頭留一指面地。勿令合。以出熱氣。如未膿。當內消。若已作頭。當撮小。若日久瘡甚。肌肉損爛。筋骨出露。即於布上塗藥貼之。瘡上乾即再換。但以鬲中不穴。無不差。瘡切忌手觸。宜戒之。劉夢得傳信方。亦載。

治乳癰發背諸般瘡毒。丹陽僧傳。

金銀花一名忍冬草。

右採葉。研爲滓。傅瘡口。花五出。而白微香。蒂帶紅色。野生延蔓。葉如薜荔而青。予見沈存中良方所載。忍冬。嫩苗治癰疽云。江西醫僧鑒清善治背疽。得其方。用老翁鬚。後在金陵聞醫王琪善治瘍。其方用水楊藤。觀之乃老翁鬚也。又友人王子淵自言得神方。活數人。方用大薜荔。又杜醫治瘍。常以二萬錢活一人。方用千金藤。又寧國尉王子駿傳一方。用金銀花。海州士人劉純臣傳一方。用金汶股。皆自神其方。求其草視之。蓋一物也。存中云。倉卒求不獲。只用乾葉爲散。并甘草酒煮服。然不及生者。

靈寶膏。治一切癰疽腦疽發背等疾。楊池州傳。云是方得之異人。和王施此藥。前後活數百人。甚有神驗。

大苽蔞十枚。隔二三年陳者盡去其皮。留穰子。紙有半升許。用砂盆研細如粉。

新胡桃十枚。不油者。湯去膜。研細如粉。

滴乳香十塊。如大指頭。大乳鉢內研細如粉。

右用白沙蜜十兩。同前藥。於銀石器內。極慢火。熬三時辰。其稠如餳糖。多合少合准此。每服二匙。無灰酒半盞調下。不拘時候。甚者不過兩三服。其效如神。

治癰疽發背初覺毒氣攻繫。赤腫煩痛方。行在金翰林傳。

犀角鎊一兩　玄參一兩
川升麻一兩　黃耆一兩
赤芍藥一兩　麥門冬一兩去心
甘草一兩　當歸一兩
大黃二兩微炒

右爲麁末每服三錢水一盞煎八分去滓不計時

發背灸法郭廷圭知縣傳

先用蠟線度左手中指頭至手掌下橫紋止其橫紋有三兩條當以長而分明者爲正卻將所度蠟線自尾閭骨取中逆量至脊搥骨如度之長以墨記之次以蠟線取中指中節量一寸中指中節兩頭橫紋多當側取橫紋中長而分明者爲正卻將所量蠟線橫於墨點處每邊各量一寸朱點記之此正灸穴處前以墨處乃用取中非灸穴也視背疽發於左則灸右發右則灸左甚則左右皆灸至三十壯而止婦人則用右手中指取度其灸法與男子同婦人妳癰凡發背發肋發腦發腿之類不論男女皆可灸郭云自得此法救人不可勝計有親戚姓陳者得此疾其妻兒告急而陳苦不之信迫不得已灸之才十壯其紅腫處漸消於是欣然聽命再灸二十壯覺熱毒之氣從腫處下如以手拓從尾閭骨發散

陳至今無恙。又云莊婦忽背間痒痛。偏背以行。問知其狀。使以法灸。隨手卽愈。如是非一。不能盡記。

發背灸法（葉子昂丞相傳）

男左女右。以手中指。自上至手盡處第一路爲度。卻用此去自尾閭骨盡處量（在腰間）點定穴。卻用中指中間一節爲度。自穴分左右。背左處發則灸左穴。右亦然。止三十艾。甚則左右穴皆灸。婦人乳癰亦用此法治之。

治背疽糝藥（童縣尉傳）

龍遊有患背疽。已潰如椀面大。視五臟僅隔薄膜耳。自謂必死。有用大鯽魚一枚。刳去腸臟。以羯羊糞實其中。烘焙焦黑。極乾燥。研爲細末。乾糝之。瘡口遂收。至今無恙。

內消發背

杏仁（三七粒。去油令盡。）　巴豆（三七粒。去）

砒砂（半錢。）　乳香（半錢。）

右將上件藥。一處研細。次用淮棗三七箇。去皮核。研碎。又用丁香三七粒。班茅三七箇。烏梅三七箇。去核。三味同爲末。通前藥拌勻。用餅藥麵十文。生麵十文。以冷水搜裹藥在內。慢火煨一日。莫令燒過。候藥熟。取出地上。將盆蓋覆。出火氣。然後去麵。只取藥細研。入少許蒸餅末。滴水爲圓如菉豆大。老者七

粒壯者十粒旋入甘草少許用馬蘭酒吞下春用馬蘭苗四兩生者秋後用馬蘭根白芽四兩研細同酒半升研去滓吞下如不飲酒蜜水亦可只可三服

治甲疽努肉裹甲膿血疼痛不差出靈苑

膽礬洗

右先剔去甲中肉傅藥瘡上縱有努肉才傅即乾落

治腫毒發背一切癰疽經驗方鄱陽都路分因請大仙得此方徐綱鑱板印施便癰腸癰皆治

橫紋甘草一兩炙乾碾爲細末

右分爲三服無灰熱酒調一服如人行一里再一服三服併喫鄱陽徐綱忽患右足赤腫三日不能履地醫治無效才服此藥須臾之間即能移步再服全愈

治腫毒發背一切癰疽奪命膏趙教授得之全州醫屢有神驗已下三方次第用之

麻油四兩熬二沸

防風一兩切焙

燈心灰一分

全蝎七箇燒存性

石蟹一枚燒米醋淬才黑又燒碎爲末

蛤蚧一對炮存性

蜈蚣一條燒

血竭一分別研

黃連半兩去蘆切焙　當歸半兩切焙

右件爲末用文武火熬麻油滴水中不散次入衆藥一處急用柳枝不住手攪候滴入水中成珠爲度候極冷貼瘡如常法

又勝冰散

茵陳半兩焙　防風半兩焙
滑石一兩研細別　當歸半兩焙
地龍半兩碾　乳香半兩別研
螺青一兩研　馬牙硝半兩研各取末

右八味一處和勻用新汲水調塗腫處不可令稀時時塗之勿使至乾

又應痛內托圓

赤芍藥一兩焙　當歸一兩焙
血竭一分研　麝香一分研
瓜蔞根二兩火焙存性　人參半兩焙
沈香半兩剉　茵陳半兩焙

全蝎七枚。煨存性。　大黃一分。焙。

右件十味。和勻爲末。煉蜜圓如彈子大。每服一粒。乳香湯化破。服之。或嚼喫亦得。不拘時。

又聖柳散

蒼朮四兩。米泔水浸一宿。焙。　連翹一兩。焙。

甘草一兩。炙。　大黃半兩。切。

人參半兩。切。　赤茯苓半兩。切。

黃芩二錢半。煨存性。　桔梗半兩。

白朮一分。　枳殼一兩。麩炒。去白。

南木香一兩。　益智一兩。去皮。切。

白芷半兩。焙。　苦參一兩。切。

右件爲細末。如渴時。加牙硝半兩。別研入。每服二大錢。水一盞。柳枝七寸。同煎至八分。去滓。温服。不拘時。

初發。卽用奪命膏貼。如胃脘滿悶。大腸祕結。卽用應痛內托圓主之。如四邊赤腫日增。卽用勝冰散主之。如煩渴不已。疾勢轉增。卽用勝柳散。此疾淺深治法次第也。忌鷄肉濕麵。疾愈半年。方可食。

治癰疽立效方小兒暑月頭額生瘡亦可用。

生水蛭一名馬蟥蜞。取數枚。實椀水中用訖縱之。冬月蟄於積水邊。或田塍水道邊。掘土取之。

古用薄紙一片。剪圓如瘡大。仍看瘡膿頭有幾箇。其紙對膿頭。作小眼。搭在瘡上。將水蛭着在紙眼處。每一膿頭。用一水蛭。要得先咂去膿。其痛立止。如無膿頭。卽以手指按之。覺最熱處是也。或用茶末。以水調塗瘡上。看先乾處。卽點記。如不能辨。卽着在中間。如膿頭只一箇。而赤暈稍大。卽近中處。加用水蛭。如膿血咂盡。痛定腫退。可用膏藥貼之。

紹興中。汀州黃守武疽發肩背之間。醫藥不瘥。用水蛭立效。因就寢。蓋被稍煖。睡覺。衣被皆溼。以燭視之。乃瘡口自出血也。水蛭咂盡惡血。不曾貼膏藥。身煖。好血隨路而出。急令取池中藕。將藕節處泥。抹瘡口。其血立止。按本草云。水蛭攻癰腫毒腫。取十餘枚。喎病處。取皮皺肉白無不差。冬月中無蛭虫。地中掘取。暖水中養之。令動。先洗去人皮鹹。以竹筒盛蛭。綴之。須臾便咬。血滿自脫。更用飢者。張仲欽運使傳云。紹興壬申歲。泌撿至汀。親目其事。

# 洪氏集驗方卷第三

蓯蓉茸附圓平補眞元益養脾腎固精壯氣暖胃思食督府王翰林方丞相兄藏書脚氣自服此藥十餘年不作

鹿茸一兩先用草燒去毛切作片子用酥炙令香熟爲度　蓯蓉四兩酒浸一宿切作片子焙乾　牛膝二兩酒浸一宿切焙　兎絲子半乾六兩酒浸兩宿炒令熟乾地黃二兩炒焙　眞烏藥一兩　川五味子一兩　附子一兩炮去皮臍　白朮一兩　天麻一兩　補骨脂一兩炒　葫蘆巴一兩炒　茴香一兩炒　乾淡木瓜一兩　沉香一分　木香一錢麵煨　丁香二錢不見火

右件搗羅爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服三五十圓空心臨臥米飲温酒鹽湯下

鹿茸世寶圓諸虛不足心脾氣弱腹脇脹急腸鳴泄瀉腹疼手足厥逆頑痺中滿惡心頭疼怯寒肢體酸

痛。飲食少思。氣短乏力。驚悸自汗。並能服之。用藥如下。（晉府王翰林方。）

鹿茸酥炙。塗。　附子炮。去臍。
白朮炒。　陽起石燒赤。
椒紅炒。出汗。　成煉鍾乳粉
蓯蓉酒浸。炙。　人參去蘆。
肉豆蔻麵裹。煨。　川當歸炒。
牛膝去蘆。酒浸一宿。　白茯苓
沉香

右件十三味。依法修製。並爲細末。次入鍾乳粉。拌勻。煉蜜爲圓如梧桐子大。每服四十粒。鹽飯飲或鹽湯送下。食前。一日三服。

五解散。治傷風感寒。或內傷生冷。頭目昏痛。身體壯熱。胸膈不快。乾嘔惡心。怯風怕寒。體虛自汗。

藿香葉一兩。去土。　人參一兩。
白朮一兩。　半夏一兩。湯洗七遍。
甘草一兩。炒。　白茯苓一兩。

陳橘皮一兩湯洗一次　厚朴二兩去麁皮用生薑自然汁塗炙紫色爲度

右件同搗爲麁末每服五大錢水一盞半生薑七片棗子二枚煎至七分去滓温服不拘時候育腸圓治遠近一切赤白痢實腸胃進飲食

當歸一兩　肉豆蔻仁半兩粟米炒以黄爲度

訶子皮炮半兩　黄連去鬚一分

烏梅肉一分　櫻粟半兩炒黄黑色

右爲細末蜜煉熟圓大如菉豆許每服十五圓温陳米飲食前平江辛太丞傳有加芎者尤妙

硫附鹽礬圓治經年久病腸風下血不止虚弱之甚者一服見效已下二方上官彦成駐泊傳

附子一兩別杵爲細末　綠礬四兩用瓶子盛蓋之火煅食頃候冷取出入鹽一合硫黄一兩同礬研過依前入瓶子内燒如食頃候冷取出再研令勻爲極細末

右件二味藥末同合一處令勻以粟米粥爲圓如桐子大每日空心用生地黄汁吞下温酒米飲亦得每服三十圓

治五種腸風下血上廁糞前有血名外痔糞後有血名内痔大腸不收名脱肛穀道四面有努肉如妳名妳舉痔頭上有孔腸出名漏並皆治之

黃牛角鰓一枝。搥碎。　蛇脫皮一條。白者。

猪牙皂角七莖。　穿山甲一處。七鱗。

刺蝟一兩。剉。

右件五味入磁瓶子內。以黃泥封固。候乾。先以小火燒令煙出。後用大火煆令通赤爲度。取出攤開。候冷。搗羅爲細末。患者先用胡桃一箇。分作四分。一分。臨臥時細研如糊。溫酒下。便睡。先引出蟲。至五更時。以溫酒調下藥末三錢。至辰時更進一服。久年不過三服。立效。

比金散。治腸風下血方。及治痔漏。又名立效散。饒州周道太丞傳。

蝟皮一箇。　皂角刺二兩。

臘藤子一箇。去穰。剉碎。別碾爲末。　猪牙皂角一兩。

白礬半兩。

除臘藤子外。右四味入磁瓶內。鹽泥封固。候乾。先以小火燒令煙出。方用大火煆令煙盡爲度。取出攤冷。竹羅細末。入臘藤子末。和勻。每服一大錢。溫酒調下。空心食前服。

治五種腸風痔疾。饒州王康孺翰林傳。

凡下血。皆謂腸風。糞後有血名內痔。糞前名外痔。大腸頭出謂之脫肛。穀道四邊有努肉。謂之鼠妳痔。

頭上出血謂之漏。此方通治之。

黃牛角鰓一箇。　猪牙皂角二兩。
蛇皮一條。　穿山甲二兩。
大附子一箇。炮去皮臍。　當歸半兩。炒。
蒴藋四兩。　麝香一錢。
蝟皮一箇。

右件一處。砂瓶內。用炭火煅令通赤。取出。於地上用盆合定。四畔用土覆之。去火毒。然後搗羅爲細末。患者先用胡桃肉半箇。研爛。同酒半盞。調藥末二錢。服之便效。

阿魏良薑圓。治三焦氣弱。中焦積寒。脾不磨。飲食遲化。喫物頻傷。胸膈滿悶。脇肋疼刺。嘔吐噦逆。噫醋惡心。腹脹腸鳴。心腹疼痛。噎塞膈氣。醫胃吐食。飲食減少。悉能治之。已下二方。上官駐泊傳。

青皮二兩。　陳皮二兩。
良薑二兩。　紅豆二兩。
桂去麤皮。一兩。　縮砂去皮。二兩。
蓬茂炮。二兩。　草菓子去皮。二兩。

乾薑炮二兩　萊菔子二兩炒
木香二兩　礞砂半錢
阿魏一分井硇砂用醋化去砂石研

右和麵煮糊爲圓如菉豆大每服五十粒淡薑湯吞下不拘時候日進二服久服大補益脾胃空腸令人能食去寒濕強中温暖如素來有沉寒積冷腹中時作疼痛宜服之或無此證去礞砂常服温養中焦有益脾胃

麋茸圓治婦人風虛勞冷一切諸疾或風寒邪氣留滯經絡氣血冷澁不能温潤肌膚或風寒客於腹內則脾胃冷弱不能尅消水穀或腸虛受冷大便時泄或子藏挾寒月水不調乍多乍少或月前或月後或淋瀝不斷或閉不通百節酸疼頭頂作痛相應臍腹腰腿痛痺不仁悉能主治大補益元臟絕忌羊血解藥力

麋茸火燒去毛薄切酥塗炙四兩　當歸去蘆酒浸一宿焙乾二兩
鹿茸火燒去毛薄切酥塗炙二兩　鹿角膠麩炒二兩
大黑附子炮去皮臍二兩　沉香二兩不見火好者
肉蓯蓉酒洗薄切焙乾三兩　牛膝去蘆酒浸一宿焙乾二兩

熟乾地黃洗焙乾秤三兩　赤石脂一兩眞者
破故紙一方酒浸一宿炒二兩　陽起石一兩半夜間用磁罐子盛以酒二升煮一宿水洗焙乾乳鉢研如粉
有麝香二兩

右十二味同爲細末用酒蜜各等分熬成稠膏子搜和成劑入木臼內杵三千餘杵圓如梧桐子大每服三十粒漸加四十粒至五十粒溫酒鹽湯吞下空心日午服之法酒二十兩蜜二十兩慢火同熬成膏子圓

人參大溫中圓治三焦不順脾胃積冷心腹大痛嘔逆惡心兩脇刺痛胸膈滿悶腹脹腸鳴泄瀉頻併溫脾暖胃婺州李醫錄林傳

人參去蘆頭一兩　白朮一兩剉
陳橘皮去白一兩　紫蘇子揀淨一兩
高良薑一兩剉　官桂去麤皮一兩
川乾薑五錢炮

右件七味爲細末煉蜜爲圓每一兩作十圓每服一圓煎生薑湯嚼下不拘時

水陸二仙丹

取鷄頭去外皮取實連殼雜搗令碎曬乾爲末復取糖櫻子去外刺幷其中子洗淨搗碎入甑中蒸令熟卻用所蒸湯淋三兩過取所淋糖櫻汁入銀銚慢火熬成稀膏用以和鷄頭末圓如梧桐子大每服

鹽湯下五十圓。久服固眞元。悅澤顏色。括蒼吳寅仲久服。有奇功。此藥稍閉。當以車前子末解之。

治諸般惡痢。腹中攪刺。日夕頻併。危惡不瘥。神應乳香圓。

安息一分。酒浸。曉三日。去滓。研爲膏。　呵子一錢。

乳香一分。酒少許。化開。曉三日。再用火焙鎔。令乾。研爲末。　沒藥一分。研爲末。用安息香膏子和勻。用生杏仁不以多少。燒令煙出。上焙膏子。一日乾爲度。

右件四味。研爲細末。滴水爲圓。如椒豆大。每服五圓七圓。乳香湯下。空心食前日三服。加至三五十圓。不忌毒物。其效如神。

治風毒上攻眼目澁痒疼不可忍者。或上下臉胞赤爛浮翳。瘀肉侵睛。神妙驅風散。出王氏傳濟方。

五倍子一兩。槌破。去塵土。　蔓京子一兩半。洗令淨。

右二味同杵爲末。每服二錢。水二盞。銅石器內煎及一盞。澄滓。熱淋洗。留滓二服。再依前法煎淋洗。大能明目。去澁痒。

治大人小兒一切風虛昏眩。神志不爽。心氣不寧。手足搐跳。睡臥不穩。虛風圓。

麝一錢。　五靈脂爲末。銀器內炒。煙盡爲度。秤一兩。

白附子眞大者。炮烈。半兩。　天南星大者。炮去皮臍。一兩。

烏蛇只用頂後肉。去皮。酒浸一宿。乾。秤一兩。　蟾頭一箇。大者。炭火燒。煙將盡。取出。不令成灰。

赤腳蜈蚣三條全者酒浸一宿焙乾

右除麝外同爲細末絕細再入麝同研勻以醇酒作糊爲圓桐子大每服一圓不拘時候或二圓以人參湯麝香湯嚼下或温酒亦得治小兒慢驚極妙

壯筋骨治腳膝疼痛四斤圓

牛膝去蘆頭寸剉焙乾秤

宣木瓜去穰切焙乾秤

天麻細剉焙乾秤各半斤

蓯蓉洗埋切焙乾秤

右件用無灰酒五升浸春浸五日夏浸三日秋浸五日冬浸十日日足取藥焙乾加附子二兩虎骨一兩虎骨細鎊附子炮去皮尖同爲細末用浸藥酒煮麵糊爲圓如梧桐子大每服五十圓温酒或鹽湯下空心食前服虎骨須用酥炙令酥

妙應圓治婦人血經不調月事淋濁加之驚憂遂發痎瘧後汗出過多損耗氣血常服滋煖子宮調血養氣池州徐學諭傳

當歸去蘆頭二兩

澤蘭取葉一兩半

肉桂去麁皮一兩不見火

延胡索去土一兩

白芍藥雪白者一兩

牡丹皮去骨一兩

川芎一兩．　木香半兩．不見火．
石斛去苗一兩．　川薑炮一兩．
熟乾地黃淨洗薄切．焙乾秤二兩．

右件修製了．焙乾．搗羅爲細末．醋煮麵糊．和圓如梧桐子大．每服二十粒．用温酒或米飲吞下．空心及晚飢服之．

丁香草藥散．治大人小兒脾虛發熱．及潮熱．藥不能治者．服之如神．余演州傳．

丁香一錢半．揀新鮮者．　草藥三箇．麵裹．煨．麵烈爲度．
麥門冬半兩．去心．溫洗．　人參二錢．
茯苓二錢半．　半夏二錢．薑製．
甘草二錢．炙．　淡竹葉數葉．

右爲麤末．分作六服．用水一盞半．薑三片．棗一箇．煎七分．去滓．不拘時服．小兒加陳皮二錢．去穰．

神仙透空圓．治男子婦人偏正頭疼．惡心．產後體虛．傷風．憎寒．頭痛．洗頭沐浴．傷風．壯熱．頭痛．痰厥頭痛．腎厥頭痛．虛眩．項筋緊急．應一切頭痛．江州陳太丞傳．

天麻一兩．洗．　香白芷一兩．

半夏一兩生用。乾薑四錢生用。地龍半兩鹽水洗去土淨。草烏一兩生用去皮尖。甘草二兩生用。

天南星一兩。川芎二兩洗。川烏一兩生用去皮尖。細辛半兩。白附子半兩。

右爲細末。以藥末一兩。入白麵一兩。用新汲水搜和爲圓。每一兩分作十圓。於新板上排定。日內熨之。如合。須是伏中合。

沉香半兩。檳榔澄茄半兩。丁香四錢。藿澄茄半兩。陳橘紅三錢。粉大甘草七錢。白荳蔻仁半兩。

南木香四錢。檀香四錢。片子白薑黃半兩。青皮去白三錢。藿香去淨土四錢。天台烏藥半兩。

沉香藿澄茄湯。治腰腿間寒濕作痛。饒州雍醫傳。

人參半兩縮砂仁三錢

右爲細末每服一二錢入鹽點服

灸結胸傷寒不問陰陽二毒只微有氣者皆可灸下火立效神功散

黃連七寸爲末　芭豆七粒去皮新瓦上出油

二味拌勻令患人仰面臥先用三斡耳和艾一炷如中指大更用三斡耳子先着在患人臍中後安艾炷其上只一炷覺臍腹間有聲即便汗出而愈

治風烏荊圓

川烏頭一兩炮去皮　荊芥穗二兩

右醋麵糊爲圓如梧桐子大每服二十圓酒或熟水下有疾食空時日三四服無疾早晨一服少府郭監丞少病風搐頤頷寬譚不收手承頷然後能食服此六七服即差遂長服之已五十餘年年七十餘強健鬚髮無白者此藥療腸風下血尤妙累有人得效下血人服此而差者一歲之內數人

烏金散治冒暑悶亂不省人事欲死及發燥引飲無度咽中痰涎不下

不蛀皂角一斤刮去皮猛火炙令成炭仍須存性不可使成白灰也秤三兩甘草一兩炙

右同爲細末。以新汲水或温熟水調三大錢服。立差。此藥神妙。不可具述。

良薑湯。治陰寒積冷。心腹大痛。嘔逆惡心。手足厥冷。心胸不快。腰背疼痛。婺州李翰林傳。

高良薑一兩。剉碎。炒。　官桂一兩。去皮。

當歸去蘆頭。用一兩。剉。炒。　乾薑一兩。炮。

人參一兩。去蘆頭。　吳茱萸七錢半。炒。

白茯苓一兩。　附子半兩。炮。

右爲細末。每服二大錢。水一盞半。入生薑五片。煎至七分。去滓。膈空服。

治氣塊刺痛。暮夜卽作。至不可忍。多因氣中傷冷所致。久而不治。婦人尤宜服之。已上二方。信守孟郎中充傳。

鱉甲去裙并膜。醋炙。半兩。　當歸去尾。一兩。

木香半兩。　青橘皮去白。一分。

枳實半兩。　人參半兩。

荆三稜半兩。　沒藥一分。研。

血竭一分。研。　檳榔一分。

半夏二錢。生用。

右爲細末。醋煮稀糊。圓如菉豆大。不計時。白湯下十五粒。遇大府通利且止。若氣發作。大府不通。卽加至五十粒。以通爲度。此病須是服此藥令氣塊消。然不可驟然多服。須待積久消磨。每日且只一二服。覺得氣消不痛。卻只一日一服。或三日二日一服。仍旋服後面散子以補氣。

常服散子

人參半兩。　黃耆半兩。
當歸半兩。　白朮一分。
木香一分。　陳橘皮去白一分。
甘草二分炙。　青橘皮去白一分。
沉香一分。

右爲細末。每服三四錢匕。水一盞。薑二片同煎。取七八分。不計時服。遇氣痛時。每服添枳實末一二豆許。

右陳侍御宜人。嘗因不喜悅中食柑。自後遂苦心腹痛。久之腹中結塊。遇痛作時。往往悶絕。移時方蘇。而常在夜間。是時侍御作辟雍博士。京師醫者皆不能治。有齋生蜀人史堪載之者。醫聞一時。乃處此二方。服一兩月間。遂去根本。後二十餘年。復因憂悒。此疾似欲再作。而已微痛。卽再合服之。數

日而愈。

治婦人產後胎衣不下（鄉人萬廉之秘校傳）。

凡產有產後胎衣不合。諸血奔入。久而血上衝心。遂致不救者。有產前失血過多。胎衣乾澁不下者。庸醫不曉。例以破血藥治之。不知血盡轉澁。遂終不救。舊有產婦胎衣不下。呻吟痛楚。聲不可聞。忽有人教之用苧麻浸水兩大椀服之。卽時嘔吐。胎衣便下。遂得更生。

安腎圓。治本氣怯弱。筋骨無力。或時疼痛。（信州李諒駐泊傳）

熟乾地黃（洗淨焙乾）一兩。　牡丹皮半兩。
附子（炮去皮尖）半兩。　金鈆石斛半兩。
破故紙（炒）半兩。　山藥半兩。
肉桂（半兩去皮）秤。　白蒺藜（炒去刺）半兩。
巴戟天（去心）秤一兩。　肉蓯蓉（酒浸一宿一兩切焙）。
白茯苓（半兩去皮）秤。　澤瀉（微炒）半兩。
菟蘼半兩。　白朮半兩。

右件爲細末。用煉蜜和爲圓如梧桐子大。每服三十圓至四十圓。用温酒或鹽湯送下。食前空心服。

治傷折內外損神授散予屢用之甚驗。

川當歸半兩洗淨別搗　鉱粉半兩洛粉最上

鶏砂二錢

右同研細每服二錢濃煎蘇枋汁調下若損在腰以上先喫淡麵半椀然後服藥在腰以下先服藥後喫麵仍不住呷蘇枋汁更以糯米爲粥入藥二錢拌和攤在上或絹上封裹損處如骨碎則更用竹木夾定外以紙或衣物護之沈存中云長安石使君一日在闇闇中忽有呼其姓第回顧不見明日過市復聞呼聲曰我無求於人以爾有難特來救爾石謝之欲下馬與語其人止之褫衣領中出一書曰有難即用稠人中遂引去石歸視乃此方也石到京師趁朝立馬右掖門外爲他馬所趨折足墮地又爲馬踏手臂折舁至家屢氣絕急合此藥服且裹半夜痛止後手足皆平復

普救散治四時傷寒渾身發熱四肢疼痛頭重眼疼不問陰陽二證並皆治之永平罷知監施此藥

蒼朮一斤米泔水浸三日切焙乾　乾葛半斤切焙

甘草四兩炙赤色切細

右爲麁末每服二大錢水一中盞煎至七分去滓熱服如要出汗加連根葱白二寸同煎併兩服滓再煎一服不拘時候仍用沙銚不得犯銅鐵器初發傷寒宜下此藥汗後勿服

治喉口熱毒至甚咽喉胸膈內連心肺疼痛飲水不下氣不能出死在須臾名曰馬閉繞州上官醫傳

巴豆七粒去殼膜研如泥

右以坏子一錢同研成膏子每用一字許醋煎皂角汁調令稀稠得所將鵝毛蘸藥掃於喉間良久咳唾出膿血或涎數升然後用第二法其法白礬飛過白僵蠶微切各半兩爲細末每服半錢新汲水調下

肉豆蔻湯治胸膈痞塞不快脾胃有傷景虛傳

肉豆蔻炮　草果子去皮
石菖蒲　乾木瓜
良薑　乾薑
厚朴薑炙　甘草炙各一兩

右等分爲細末每服一錢鹽湯點服

# 洪氏集驗方卷第四

治舌衄二方出方氏泊宅編

槐花

右炒爲末摻之昔有士人無故出血仍有小穴醫者不曉何疾偶曰此名舌衄用此而愈

治舌腫

蒲黃

右爲末摻之須眞者佳一士人泛汴東歸夜泊村步其妻熟寐撼之問何事不答又撼之妻驚起視之舌腫滿口不能出聲急訪醫得一叟負囊而至用藥摻比曉復舊問之乃蒲黃也

治湯火瘡

大黃

右搗碎調以美醋傅瘡上夷堅志云金山修供神怒庖人不謹漬其手鑊中痛楚徹骨號呼欲死神授此方遂愈

葹蓉圓暖水臟明目京師老李畫專尋常眼藥多涼非水藏之便

莵絲二兩酒浸一宿焙乾　巴戟
枸杞子　菊花
川練子各一兩

右爲末煉蜜爲圓如桐子大每服三十粒温酒或鹽湯下空心食前臨臥

治乾癬已下八方景盧傳

樟腦一錢　白礬半錢生用
雄黄半錢

並細研以生薑自然汁醯醋各少許磨羊蹄菜根如手指大二寸許調藥擦傅止有食頃痛極不過三次見效

治淋

皂角刺燒存性　破故紙等分

爲細末紅酒或無灰酒調下

治沙石淋

定磁末羅細以生地黄槌碎同煎如熟水時時飲之

治毒蛇傷屬試如方.

香白芷爲末.麥門冬水調飲.倉卒時.新汲水亦可.

治冷積降氣.寬膈.逐痰.

橘皮去穰.取紅一斤.甘草.鹽各四兩.水五椀.慢火煮乾.焙搗爲末.點服.

補益治漏祕精圓

大附子炮裂.去皮臍.　龍骨煆通赤.

牛膝酒浸一宿.焙.　肉蓯蓉酒浸一宿.焙.

巴戟去心.　菟絲子酒浸三宿.

右等分爲末.煉蜜圓梧桐子大.空心.溫酒或鹽湯下三五十粒.甚者.日午再服.小便如米泔者.不過十服.

治傷折骨碎此方用之甚驗.

大鰾膠一味.碎剉.用無灰酒煮爛如粥.逐旋抄喫.極苦硬.須強進之.以多爲度.每二兩或四兩爲一服.傷甚者.不過半斤.

治疝氣偏墜

牡礪火煆　良薑

右二味爲末用津唾調塗之立消

烏金散專治痔疾神驗已下五方饒州王康孺輸林傳

黃牛角腮　烏金子

五倍子　紫河車

威靈仙　枳殼

右等分入甆瓶內用白雄鷄糞和黃泥固濟上留一竅子炭火煆煙盡爲度取出地上出火氣爲細末

每服三錢空心酒調下

倍苓圓治腸風下血

槐花六兩　五倍子三兩

五靈脂三兩

右件爲細末麵糊爲圓如梧桐子大每服三十圓米飲下

治風毒氣眼連眶赤爛洗眼神妙

白沙蜜二兩　乳香通明者一皂大溫水浴過

好黃丹抄半錢。

右一處。於砂石器內。或銀器內。用慢火熬令焦黑色。滴在水中不化爲度。每用兩黑豆大。沸湯浸洗眼。藥成。露一宿方好。

治腰痛

五加皮

右不拘多少。爲細末。如梧桐子大。酒煮麵糊爲圓。每服三十圓。空心溫酒下。

秋石丹治男子婦人虛勞瘦

秋石一兩。　乾山藥一兩。

右爲末。別以酒調山藥爲糊。如梧桐子大。又以乾山藥爲衣。每服二十圓。溫酒米飲任下。

治諸痼（道人黃大成傳。）

鴨舌膽（攀暇存性。）

右爲細末。每發時。用一字。以筆管吹入鼻內。涎出卽愈。

治豆瘡。倒撅入肉。（录盧傳。）

人齒一箇。（不以久近。）燒成灰。用豬尾血調和了。入酒小盞同服之。（永仲教授年六歲時。生瘡。爲鄰近焚

化所觸。盡撅入肉。諸醫束手。母已發聲哭。親戚劉知縣說此方。才飲酒了。元瘡隨手如故。（予見沈存中良方亦載此。用人齒三五枚。炙黃爲末。乳香湯調下。溫酒亦得。）

治喉閉（陳子範教授傳。）

皂角（半挺。）

右擣爲末。用醋一椀。就鍋內煎數沸。以帛濾滓。令病人服之。

又方（高逢辰制幹傳。）

麻油（少許。生油。）

右以筋絞油生沫。卽以油沫飲之。

治腰痛（已下二方。孫仲益尙書傳。）

芸臺子

右用米醋研。塗傳疼處。

治腸風

橡斗子

右以乾大棗。置橡斗子中。以麵裹。火炮碎爲末。用陳米飲作一服。

瘡藥方饒州十七里李家傳甚妙。

叢竹殼　野油麻葉

陳屋茅　百合花乾者。

猫兒骨

已上燒灰。入輕粉和麻油調。塗。

治癬

羊蹄根切作片。

右至五更初。先以布揩癬上。卽取羊蹄根。爛嚼。止用汁塗。後以其片揩之。將冷水嗽口及洗手。初用藥時。忌不得語。欲氣勿洩也。

接骨方

牡蠣少許。

右爲末。用糯米粥調之。塗其上。卻以沙木板夾之。卽愈。

治漏瘡高逢辰制幹傳。

麝香　臈茶

右等分爲末乾傅

治外風入瘡口腫毒方

全蝎一箇　白殭蠶三箇去絲

蟬蛻三箇

右爲細末裂葱汁調塗卽愈

癬藥

白礬飛過一兩　黃丹半錢

白藥子半兩

右爲細末旋掘羊蹄根獨腳者一根者是取自然汁調藥先用布擦癬微破用藥傅之

治喉閉郭廷圭知縣傳

白礬一斤好者　好酒一斗無灰

右同熬以酒盡爲度入合子臨時用之

治盜汗

防風細切

右爲細末。浮麥煎湯服之。婺州汪伯敏將仕云。嘗見周仲恭尚書言。舊有盜汗之疾。每至大屋。則肢體凜然。須以幃幕遮護。後得此方。遂愈。

治傷風

五積散。敗毒散。

右以二藥合煎服之。蓋五積性温。敗毒稍涼。服之無不效者。

治腳腫

四物湯。小續命湯。

右以二藥同煎。章謐靜之節推云。嘗有人卒患腳腫。服此遂愈。

甘豆湯。治腳腫。

黑豆　甘草

右同煎湯服之。郭鎮廷圭知縣云。昔年太學士人。園閉中。多患腳腫。至腹則死。前後如此者非一人。後有施此方。服之皆愈。蓋神方也。

灸勞法

以肚臍相對。取背脊骨。灸之甚妙。

治頭風頭痛

人中白　焰消各一兩

右用水一椀。無灰皮紙濾下。研細。重湯煮過。再研。入少腦子。每用少許。以斡耳子。搐入鼻中。卽愈。襄陽府胡急腳專貨此藥。積錢至數萬緡。祕惜不傳。上官醫以計得之。

茶牙湯治偏正頭疼。惡心嘔吐不止者。

細茶牙一兩　生草烏半兩。去皮尖

細辛半兩

右爲麤末。每五錢。水二盞。慢火煎至六分。去滓。溫服。一服取效。

治丈夫婦人腰痛重腿。步武艱辛。痛不可忍。附牛圓。上官駐泊傳。

附子半兩。炮去皮臍　黑牽牛瓦上炒令乾一兩

右爲細末。酒煮麵爲圓。如梧桐子大。每三十圓。空心溫酒下。如半邊腰疼。只用黑牽牛瓦上焙乾一邊。附子炮一邊。餘一邊生用。不去皮。搗羅爲末。如前法服。

治爛絲風眼

覆盆子

右取葉挼碎。以汁滴眼中。卽有蟲出。上官醫云。頃歲寓居潭州瀏陽縣石霜寺。有皇叔太尉者。乳媼患爛緣風眼。近二十年。一日有藥嫗過之曰。老婆能治此眼。眼中有蟲。赤而長。其細如絲。遂入山取藥。其家遺八尾。其後。但見泌山路。採取樹葉。以手挼碎。入口咀嚼。留其汁。以皂紗蒙患人眼。握筆畫雙眼於紗上。然後用藥汁滴於眼之下緣。須臾蟲自紗中出。其數十七。其家甚喜。嫗去數日。復至。則眼下緣肉乾如常人。再用前法治眼上緣。得蟲又以十數。嫗謂上官曰。公爲醫官。不可不傳此方。須以錢二萬償我。上官諾之。遍召傍近村婦患此眼者。治之無不差。嫗又曰。是方出本草菓部中。覆盆子注云葉挼絞取汁。滴目中。去膚赤有蟲出如絲線。上官屢用之皆效。

治瞷瘡 上官醫傳。

鱔魚

右以鱔魚數條。打死。先用油塗其腹。實患人腿上。盤令周遍。以帕子縶定。食頃。患人覺痛不可忍。然後取鱔。鱔腹上有針眼大竅子。皆蟲也。蟲旣去盡。卻用死人脛骨燒灰。塗瘡口。卽愈。沈存中良方。亦載活鱔治漏瘡。

治癬疥

宜連 去鬚。酒浸一宿。

右焙乾爲末。蜜圓如梧桐子大。空心日午臨臥。酒吞二十粒。東坡云惠州軍校姚歡。年八十餘。鬚髮不

白自言年六十歲患癬疥周匝頂踵或教服黃連遂愈久服故髮不白

治腳氣灸法

右灸風市兩穴以多爲貴蔡元長爲開封少尹一日據案忽覺蟲自足心行至腰間落筆暈倒久之方甦椽曹曰此疾非俞山人不可療使呼之俞曰眞腳氣也灸風市一艾而去明日又覺蟲自足至風市便止又明日疾如初召俞俞曰是疾非千艾不可一艾力盡故疾復作蔡如其言灸數百自此遂愈（沈公雅檢正說予紹興辛巳歲在吳門虛邵宅以備巡幸徒治吳縣縣卑溼始得足痺之疾以風市爲主兼肩隅曲池三里灸之即愈）

治毒蛇咬毒氣已入腹青黯腫脹痛不能忍（太平州湯三翁林傳）

生白礬末須看所咬瘡口大小然後抄礬末於刀頭上鎊令沸乘沸滴在瘡口上隨手痛止若腹中毒氣未退依前黯腫即取草決明葉兩握研取自然汁以熱酒侵下卻將滓貼瘡口上軟帛輕手繫之

治鼻衄不可止欲絕者

右茅花無即以根代每服一大把剉水兩椀煎濃汁一椀分二服沈存中云林次中御史在楚州嘗訪一故人久之不出或問之云子婦衄血垂盡方救視未及延客坐中一客云適有藥急令掇茅花一大把煎濃汁一椀帶囊中取小紅圓二粒令茅花湯吞下一服即差而不言其方後有人聞之曰此止是茅花之功耳試復問之其人大笑曰誠如此紅圓乃含香硃砂圓恐不信茅花之功以此爲記耳存中

在鄙延時一將官卒病衄甚困以此療之即差又徐德占教衄者急灸項後髮際兩筋間宛宛中三壯立定蓋血自此入腦注鼻中常人以線勒頸後尙可止衄此灸決效無疑

治諸鯁

以木炭皮爲細末研令極細如無炭皮堅炭亦可粥飮調下二錢日四五服以鯁下爲度此法人家皆有沈存中云在漢東乃目覩其神有劉晦士人隣家一兒誤吞一錢以此飮之下一物如大烏梅剖之乃炭裹一錢也池州徐使君極寶此方數數用之未有不效者近歲累有人言得此方之效不復悉載

治盜汗

當歸半兩去蘆細切　人參半兩　猪心一箇雄者細切

右以猪心分四片用一片水三盞煎一盞半作二服一方當歸人參各一兩雄猪心半箇細切五盞水煎三盞去滓兩服

龍鬚散治中暑迷悶不省人事暑月代一切暑藥予暑月常合此藥以飮從者

甘草一兩炙　烏梅一兩去仁瓦上焙乾

白礬半兩生研　五倍子一兩揀

右爲細末入白麵四兩同和勻每服一大錢新水調下如泄瀉霍亂作渴一服卽愈雖平日不敢飮冷

者。以冷水服藥不妨。世傳仁廟所賜近臣方。

治風牙疼

華陰細辛　多年石灰

右二味。等分爲末。每用少許揩牙。瀝去涎。温水灌漱立止。

治蛀牙疼

巴豆不以多少去殼。麵裹煨熟去麵。粟米飯同巴豆研爲圓。如蘿蔔子大。每用一二粒。綿裹安於蛀孔內。仍睡少時。覺不疼去之。

治風牙蛀牙一切疼痛每用藥止用一米大。仍以連帶貼之。

巴豆一大箇去大皮。　豆豉七箇。

大蒜頭一箇去鬚并去薄皮。

右作一處研極爛。圓作一團。用油紙裹。每遇牙疼至臥時。先以温水漱口。次以針微剔所痛之處。以藥實之。明日復以水漱灌即愈。

治五種牙疼不蛀破處者。

細辛

川烏　草烏
華撥　吳茱萸各半兩
茵草一兩　木律一分
右爲細末先用鹽湯醲濕手點藥揩牙候良久藥力敗用温水灌漱齒痛卽止
治風蛀牙如蟲蛀破者
乳香一錢　巴豆三粒紙裹壓去油
右火上鎔乳香成汁用巴豆不住攪和候冷取出圓成膏子酌量牙齒竅穴大小將燈上炙旋圓納於穴中痛卽止
治牙搖牙宣湯致遠知院傳
蘘草根一名香附草
右去皮細切用生薑汁浸一夕次日曝乾熬爲末用之
治暴嗽不止或失聲者饒州上官監傳
款冬花去枝杖細剉焙乾爲細末
右用生蜜搜和作餅子貯火香爐中如裝香然安藥在火上令病人開口噙煙米飲吞下臨臥時予頃年見

紹興增判宗云。先以款冬花。在香爐中燒煙。却用小竹罩罩之。止露一竅。承之以口。凡三兩次。嗽即止。

治惡瘡久不較諸藥無效

白鱔魚頭（乾者）

右燒爲細末。用輕粉調塗。

治冷漏（行在鄱春大夫傳）

蜣螂蟲（化蟬）

右用三兩枚。於瓦上炒成灰。乾摻瘡口。

治喉閉

南鵬砂一錢。　青黛一錢。

甘草半錢。　白僵蠶二錢。

右爲細末。用腦子少許。研和。乾摻喉間即愈。

治咽喉腫痛

白礬（飛過）　甘草（炙）各半兩。

右爲細末。乾摻喉中。徐徐吞下。

治凍死

舊薦

右用薦束凍死者其中。衰轉不絕手。自然和氣相續。卽愈。

治喝死

泥漿

右於行路中。旋以刀器。掘開一穴。入水其中。攪之。卻取爛漿。以飲死者。卽愈。

治溺死予在鄱陽。嘗有溺水者。身僵氣絕。用此法治之。卽甦。

乾壁泥

右先打壁泥一堶。置之地上。卻以死者仰臥其上。更以壁土覆之。止露口眼。自然水氣翕入泥中。其人遂甦。

治火燒湯潑

醋

右以酸者。用手擦地上泥塗之。

治湯火瘡

釜鑊下黑塵

右以水爛研入蜜及油調傅立愈。

治嵌甲

青蠅四十枚。　麝香百文。

右取蠅折去兩翼不用。以其餘煨乾。入麝爲末。或急用。則取蠅置懷中。候乾摻之。或瘡乾卽入油調傅。又一方。用蝎牛一枚。皺癭核一枚。燒存性。同爲末。入膩粉黃丹油調傅。然不若此方爲妙。

治小腸氣

舶上茴香一斤。

右用生薑四兩研碎。併滓汁拌和茴香過一宿。煨焙乾爲細末。次用青鹽二兩別碾入藥。酒糊爲圓如梧桐子大。每服三五十圓鹽湯或温酒下。空心食前。郭廷圭知縣云。舊苦此疾。歲不下五七發。服藥一料。病根遂除。今已十五六年不作。

# 洪氏集驗方卷第五 婦人小兒

治婦人產後百病烏金散饒州彭氏傳有歌苔十八篇文多不載




燒時切忌婦人鷄犬見如見服之無効功須忌之用一塹依此寫訖定四面各立坯子作一圈子其頭髮鯉魚皮各用一藏瓶去底入藥盛訖却用瓦子蓋用好紙筋鹽泥固濟乘濕放在土字上用木炭火五斤燒通赤取藏瓶放冷打開出藥

血餘半兩依前法燒之

沒藥半兩

伏龍肝一分竈下取燒赤者土是

好香墨半兩生用

當歸半兩去梢土微炒令香用之

鯉魚皮一兩依前法燒之

紅花一分生用

凌霄花半兩色鮮者焙使

乾柏木一分細研入香好者可使

右件九味並細爲末產後母子熱疾後胎死在腹難產生衣不下血暈起坐不得如見異花口乾心悶

乍寒乍熱。四肢浮腫。言語顛狂。見神見鬼。不語。瀉痢。腰膝疼痛。小腸尿血。澁痛。崩中。嘔逆不安。咳嗽涕唾。喉中如猫作聲。面色遍身黑。赤點子生。眼澁。腰痾。身發筋急。應是一切產後諸疾。皆治。以酒一盞煎取八分。調藥兩錢。空心頻服之。用無灰酒大妙。

催生如聖散

黃蜀葵花

右一味。焙乾爲細末。每服二錢。熟湯放温調下。神妙。或有漏血胎臟乾澁。難產痛劇者。併進三服。良久。腹中氣寬胎滑。即時產下。如無花。只用黃蜀葵子。爛研小半合。以酒調。濾去滓。温飲。尤佳。（予家常合以濟人。甚驗。）

萬靈圓。治婦人月水湛濁不通。久無嗣息。血癖氣痛。四肢浮腫。嘔逆。心疼。虛煩。勞悶。面色痿黃。崩漏帶下。寒熱蒸勞。頭疼齒痛。血下無度。淋瀝諸疾。產前安胎。臨產催生。產後胎結痛。傷寒煩渴。瀉痢。血勞。血運筋攣。痰盛頭疼。敗血上衝。血刺。泄瀉。咳嗽喘急。嗽血。血塊起伏。氣痞氣膈。血作腰痛。小便不禁。子死腹中。失蓋汗不出。血風。脚手痺頑。凡產後諸疾皆治。

牡丹皮洗。　川薑本洗。

川當歸切開。裏面赤黑色者佳。洗。　白茯苓去皮。

赤石脂別研。　香白芷

官桂去皮。不見火。　白薇洗。
京芎洗。　縣胡索去皮。
白芍藥　白朮米泔浸一宿。已上各一兩。
甘草炙。　沉香不見火。
沒藥別研。已上各半兩。

右件藥材。皆用温水洗淨。杵羅爲末。煉蜜圓彈子大。每服一粒或半粒。空心温酒化下。凡妊娠臨月。服此五六粒。產時無痛。如久無子。服二十粒。當月有子。幷治積年血風。半身不遂。種種血疾。不問年深。皆可療。神效不可具述。

## 烏金散。治血崩漏下。最治產後血崩。幷小產血崩漏下

烏梅　櫻櫚皮
乾薑燒灰存性。三味各等分。

右研細。每服二大錢。煎烏梅湯調。温服。不以時。

## 救生散。治急喉閉。產前產後有此疾。皆可服之。

甘草生。一錢重。　白殭蠶半兩。去絲。剉。略炒。

右二味各取末秤和勻每服一錢匕以生薑汁調藥令稠灌下便急以温茶清衝下治妊娠忽然下血腰痛不可忍

鹿角一兩劉當歸一兩劉

右二味作一服以水二盞煎至一盞去滓温服食前

治婦人產後因驚或怒傷肝或憂氣逆中脘或坐草風入子藏遂成顛狂或成中風不語角弓反張狂走歌唱不常

荆芥穗瓦上焙乾

右爲細末每服二大錢熱米飲調下酒亦得用之如神

催生藥

香白芷　百草霜

右等分爲末用童子小便却入酒醋少許沸湯調下甚有神驗

滑胎易產神效八味散一名如意散已下四方太平州郭師顯駐泊傳

甘草一兩炙　黄芩

大豆黄卷　乾薑

吳茱萸　麻子仁
大麥蘗炒。已上各四兩。　桂心三分。
右爲末。酒服方寸匕。湯飲亦得。空心食前。須入月方得服。過三十日。動作宜謹。勿上厠。恐不覺墮地。如此之易也。

治產後虛眩不能支持。兩脇當臍急痛。氣上衝。前後相引痛。治之如神。羊肉湯。
精羊肉切。四兩。　當歸切。半兩。
川芎剉。半兩。　生薑切。一兩。
右以水十盞。煎至三盞。掠上沫。去滓。分四服。空心熱服。一日服盡。來日再合兩日滓。併一日煎之。當一劑服。

產後防暈方
舊漆器
右不以多少。烈火燒煙。薰鼻中。卽醒。

治產後大便不通
緣亡血過多。腸間乾燥。甚至旬日。已上腹脹急痛。悶冒。氣喘神昏。力弱。欲攻之則必致危殆。不攻則無

緣得利。郭醫云嘗用古方蜜導法。卽時得下。且無所損。眞活人之法。其方雖見仲景傷寒論。而產家不載。最爲緊要。

順經散。治小兒十餘歲。因驚之後。心氣不行。小府淋瀝。日及三十餘次。漸覺黃瘦。宜服此劑主之。高逢辰制幹傳。

韭子湯浸退取白乾秤一兩。　益智子取仁鹽炒過半兩。

琥珀半兩令研。　石葦去毛土一錢。

白茯苓三分。　狗脊燋去毛淨半兩。

石鼈子火煆醋炒出火毒令研極細半兩。

右七味爲末。和勻。每服一錢。用韭菜白。煎湯調下。空心食前各一服。日午一服。尤妙。予表姪十餘歲時。嘗遊慧山。歸已昏暮。遇一巨人醉臥寺門。驚悸得疾。自是之後。一日便溺五六十度。醫治數月不能效。遂以病證扣高逢辰。卽援筆授此方。服藥未幾日減一日。初則三二十度。最後十數度。凡服兩料而愈。

九寶飲。治小兒因傷寒邪不曾解利。致成遠年嗽。兼治上喘氣嗽不得睡。常州頓助教傳。

紫蘇葉一兩。　蒌苛葉一兩。

麻黃一兩去節。　大復皮一兩。

肉桂半兩。　甘草半兩炙。

杏仁牛脾炒。　桑白皮半兩。

陳橘皮半兩。去穰者。

右件爲麄末。令將杏仁研極細。將諸藥同和勻。每服半錢。水半盞。烏梅半枚。生薑一片。同煎三分半。食後去滓温服。臨睡亦得。忌酒腥之物。

治小兒泄瀉

金液丹。青州白圓子。

右以二藥等分細研。用麵糊圓如黍米大。每服五十圓。米飲下。臨安節推章謐靜之云。渠有小兒。自五月患臟腑。至七月不止。遂作慢驚候。以此藥投一服。徐用少粥壓之。卽愈。再服六七服。遂無事。錢氏小兒方亦載此。

肥兒圓外臺朱臨江傳

川黃連　蕪荑仁

神麴炒。　大麥孽炒。

右四味。等分爲細末。用豬膽爲圓。如小菉豆大。每服三十圓。加至五十圓。食後熟水吞下。此方乃李文定丞相家方。海鹽祝宰爲常寧時女子失妳。極黃瘦。丞相孫維翰來訪。爲專此方。自云其家得此藥。小方脈未嘗登門。女子自服此藥。十日間取下疳蟲僅萬餘。自此日益頑壯。須小兒可服藥卽與之。孟正云。秦相

家盡服此藥。但加蘿蔔子一味。

神麴豆蔻圓。治小兒疳氣。羸弱。臟腑虛怯。及滑泄不止。飲食減少。腹脹寒熱。面黃肌瘦。引飲無度。

神麴半兩炒。　肉豆蔻三枚麵煨。
麥孽半兩炒。　宣連半兩去鬚。
史君子十四枚去殼。　蕪荑仁一分。
蘆薈一分研。

右爲細末。用猪膽汁浸麵作糊爲圓。如黍米大。每服二十圓。飯飲吞下。空心服。

木香分氣圓。治小兒脾胃虛弱。飲食過傷。積滯內停。或多吐噦。胸膈不快。面黃腹急。下利無度。

香附子水浸一宿。搗去黑皮。令淨。飯上蒸過一次。焙乾。秤二兩。　南木香一錢。麵裹煨。
縮砂一分去殼。　甘草半兩炙。
京三稜半兩。濕紙裹煨。乘熟切焙。　薑黃半兩。米泔水浸一宿。切焙。

右爲末。用白麵糊爲圓。如黍米大。每服二十圓。飯飲吞下。溫熟水亦得。食後服。

助胃膏。助小兒胃氣。思食。止渴。常服甚妙。饒州張采助教傳。

## 人參　白朮

甘草　茴香各半兩
乾山藥一兩　檀香一錢
烏梅肉半兩　白豆蔻仁半兩
縮砂仁半兩　乾木瓜一兩

右爲細末。煉蜜爲膏。空心如皂子大。每服一圓。嚼服或温水吞下。

治小兒麻豆瘡子已出太盛。發潰膿水黏衣着席。不能轉動。疼痛濕爛。傳之便乾。更不成瘢痕方。

右用牛糞。不以多少。曬乾。火煆成灰。取心中白者。研令極細。如用蛤粉相似。用綿撲撲有瘡處。不以時候。一方用烏牛糞。一方用黄牛糞。出幼幼新書。一名白龍散。此方用之有驗。

辰砂安驚圓。理風熱涎盛。身體拘急。睡中不穩。鎮心。已下三方。張采助教傳。

天麻一分　川芎二錢
防風半兩。洗去蘆頭　甘草炙一兩
白附子一分　人參半兩。洗
茯神半兩　朱砂二錢。一半入藥。一半爲衣

右細末。煉蜜爲圓。如鷄頭大。每一圓至兩圓。用薤苛荆芥煎湯化下。

羌活膏散風熱化痰安驚

羌活半兩　荊芥穗半兩
白朮二錢　甘草半兩
白附子二錢　桔梗去蘆頭洗半兩
白茯苓二錢　川芎二錢
防風二錢去蘆頭　朱砂二錢一半入藥一半爲衣

右細末煉蜜爲圓如皂子大每服一圓至兩圓用蔥苛湯化下如涎盛加腦茶湯下

大天南星圓治小兒急慢驚風涎潮發搐目睛上視口眼相引牙關緊急背脊強直精神昏塞連日不省

滴乳香研　龍腦研
牛黃研各半錢　朱砂研三錢
麝香研一錢半　天麻
人參　防風各去蘆頭一分
天南星黃牛膽汁製半兩　乾蝎十四箇湯浸軟去腹內土微炒

右細末煉蜜爲圓如大鷄頭大每服一圓荊芥蔥苛湯化下

治祿中小兒臍風撮口法

右視小兒上下齗齗當口中心處若有白色如紅豆大此病發之候也急以指爪正當中揑之自外達內揑令匝微血出亦不妨又於白處兩盡頭亦依此揑令內外斷只揑令氣脉斷不必破肉指爪勿令大銛恐傷兒甚沈存中云爲河北察訪使日到趙郡有老人來獻此法云篤老惜此法將不傳願以濟人詢之趙人云此翁生平手救千餘兒矣環數邑之人皆就此翁治兒應手而愈

沒石子圓治小兒吐瀉臟腑不禁上官醫傳

黃連鷰爪者炒　訶子炮去核　肉豆蔻麵裹炮　木香炮　沒石子炮

右各秤一錢爲細末粟米飯爲圓如菉豆大米飲三十圓

誤吞珠銅鐵而哽者方

燒弩銅牙令赤內酒中飲之立愈

誤吞錢方

擣火炭末服方寸匕則出

誤吞釘及箭金針鐵等物方

多食肥羊肉脂及諸肥肉自裏出。

封顖

天南星一箇極大者。

右以慢火炮裂去皮臍。入華陰細辛三錢。同杵爲末。入麝香少許。用米醋調。塗緋帛。貼在顖上。以乾爲度。

治小兒吐宗人子與寺丞傳。

赤蠜半兩。　藿香葉半兩。

丁香一分。不見火。如熱吐。即以丁香之半。　肉豆蔻一箇。麵裹炮。

右爲細末。每服一錢大段。小者半錢。煎香楠木湯調下。楠木定驚止吐。神妙不可言。

治小兒誤食穀芒

鵝啞

右將鵝倒瀝。啞盛半蛤蜊。令小兒飲之。穀芒即下。

消風散。治小兒一切口瘡。幷重舌鵝口。已下五方。信州蔡敏脩助教傳。

鵬砂一錢。　朱砂一字。
雄黃一錢。　甘草末一字。
腦子一字。
右研細和勻少許。傅之。吞嚥不妨。屢用如方。

雄朱散治小兒頸頷裏外腫核。
石膏二錢。　雄黃二錢。
牙消一錢。　天竺黃二錢。
甘草末一錢。　腦子半字。
右研細和勻傅之。裏核喫不妨。外核用蔞苣汁調塗繳口。新水調亦得。

金華散治小兒一切瘡瘍。
黃皮去麤皮半兩炙焦。　黃連半兩。
海漂消三錢。　五倍子三錢。
輕粉一分。研入。
右爲細末。和勻。瘡乾用油調傅。濕時乾傅。

如聖散治小兒一切頭瘡

松脂半兩（研細）　輕粉半兩

右件和勻油調傅之

急風散治小兒喉閉咽痛

青膽礬成片好者　白礬枯一分

每用少許研細新水調少許嚥之吐痰爲妙大人亦治

墜涎圓治咳嗽化痰（已下二方張耒助教傳皆有神驗）

天南星去皮臍生用半兩　白附子洗去皮半兩

川烏尖去皮臍生用一分　白殭蠶洗淨直者一分

半夏洗淨生用一兩

右爲細末用薑汁糊爲圓如小菉豆大每服二十圓用生薑蔞苛泡湯吞下

辰砂圓治咳嗽安驚化痰

辰砂半兩（一半爲衣一半入藥）　白礬枯半兩

天南星去皮臍切作片子再用雪水煮焙乾一兩　大半夏湯浸七次用生薑自然汁作餅子炙一兩半

白附子去皮炮半兩

右爲細末用糯米粉煮糊爲圓如小菉豆大每服二十圓用腐茶薄苛湯吞下

四君子圓治脾虛受食不尅化停積中脘吐逆惡心臟腑泄瀉常服消化食滯進美飲食厚腸胃充肌體悅顏色退黃婺州蔣助教傳已下三藥予家常合甚效

縮砂仁　烏梅肉焙乾秤

陳橘皮去穰取仁　呵子紙裹煨去核取皮用

右各一兩爲末煮好大棗取肉爲圓如麻子大每服三十圓至五十圓棗湯熟水任下無時

肥兒圓已下二方張來助教傳

黃連炒　蕪荑仁炒

神麴炒　麥孽炒

蘆薈細研已上各等分

右爲細末豬膽汁調麵糊爲圓小菉豆大每服十五圓至二十圓飴飲吞下

觀音散理脾胃不和氣弱昏倦多困不思食

白朮一分　人參一分

甘草一分炙　乾葛出粉一分　藿香葉一分　白扁豆三錢炒　茯苓三錢　櫻粟子三錢炒　綿黃耆一分炙　木香一分

右爲細末每服二錢用生薑棗子紫蘇煎湯調下不計時日進三服

右集驗方五卷.皆予平生用之有著驗.或雖未及用而傳聞之審者.刻之姑孰.與衆共之.乾道庚寅十二月十日番陽洪遵書.

賢人留意濟斯民學仕之餘未捨勤猶訪醫方治疾病豈因富貴墮心身迺知後世家風遠想見當年德業新愧我長貧仍懶墮不能望見屬車塵

洪公當宋盛時爲侍從官兄爲宰相其富貴爲何如也而懇懇不忘救民之事著成方書百世行之

余素不諳醫而喜蓄醫書非眞好醫書也好醫書之爲宋元舊刻者今茲六月中有揚州書友來告余云有宋板太醫集業四册欲售余屬其携來久而未至聞已售于他姓亦不甚惜之因向來各家書目未載卽舊藏書家亦俱不知或是書未必眞宋板後閱陸其清佳趣堂書目載是書云文淵閣藏本有楊南峯鄒臣虎二跋方悔前此不之買而已弗可追矣適余友陶蘊輝從都中寄此宋板洪氏集驗方二本至乃欣然以爲聊勝我欲蓋此宋板醫書亦所罕有見有季氏圖書隨檢延令宋板書目知卽係是書卷後八行墨跡季氏云鮮于樞詩跋諒必有本而云然百世行之已下定有脫文想滄葦收藏時必未遺失故知之詳也至于板刻年月載之甚詳宋刻固無疑義而余舊藏傷寒要旨與此同出一手黃憲毛用刻工姓名可攷而證刋刻之地同是姑孰刋刻之時同是乾道唯辛卯差後庚寅一年爾二書之分不知幾時二書之合又在一地豈非奇之又奇耶餘言詳彼書跋語中茲特誌得書之由幷誌余所以考證是書者如此甲子十一月蓑翁黃丕烈識

頃在楊州郡齋。借到太醫集業。尋覽之餘。見板口有三因字。遂取三因極一病證方論互勘。知卽割裂其殘本爲之耳。太醫集業者。第二卷之一條。並非別有此書也。佳趣堂書目所云誤。歸晤蓺翁。出示是跋。舉以語之。囑記於後。他年倘仍收得。必拊掌一唉。嘉慶乙丑八月澗蘋顧廣圻書。

王雲五主編

叢書集成初編

全生指迷方及其他一種

中華民國二十八年十二月初版

發行人　王雲五　長沙南正路

印刷所　商務印書館

發行所　商務印書館　各埠

（本書校對者殷師竹徐鼎銘）

G一六一八上　徐譜